



Manuel Utilisation Prescription médicamenteuse V1



Société EMA (Engineering Medical Application)

<http://www.hemadialyse.com>

9 boulevard François et Émile Zola, 13100 AIX EN PROVENCE – France

Hotline : 0825 890 531 - 04 42 03 97 52

@ : support@hemadialyse.com



Année de marquage CE : 2021

Année de mise sur le marché : 2014

M03d v1.0	Nom du document	Numéro de version	Date de dernière mise à jour	Page
	Manuel utilisation HMD LAP	1.2	21/04/2021	1/51

Sommaire

Table des matières

1.	Généralités et vue d'ensemble	3
1.1.	Introduction	3
1.2.	Prérequis	5
2.	Utilisation du module de prescription	6
2.1.	Conditions d'accès à VIDAL depuis un poste	6
2.2.	Consulter la liste des traitements du patient	9
2.2.1.	La liste des traitements médicamenteux actifs	10
2.2.2.	Modification/arrêt d'un traitement	11
2.2.3.	Barre d'outils horizontale	12
2.2.4.	Afficher le détail d'une prescription	13
2.3.	Saisie d'une prescription médicamenteuse	14
2.4.	Validation Pharmacie	21
2.4.1.	Depuis la page Traitements	21
2.4.2.	Depuis la messagerie Hemadialyse	24
3.	Paramétrage relatif au LAP	26
3.1.	Bibliothèques et référentiels des médicaments	26
3.2.	Editer le dossier patient	33
3.2.1.	Saisir des allergies	33
3.2.2.	Saisir des pathologies/comorbidités associées pour le calcul VIDAL	34
3.3.	Paramétrage général	38
3.3.1.	Traitements	40
3.3.2.	Traitements (2)	41
3.3.3.	Traitement en séance soumis à restriction	42
3.3.4.	Antibiotiques / réévaluations médicamenteuse	42
3.3.5.	Ordonnances	43
3.3.6.	Pharmacie / Vaccination	44
3.3.7.	Photos Traitement	45
3.3.8.	Paramétrage des options VIDAL®	46
4.	Avertissements et précautions d'utilisation	48
5.	FAQ	49
5.1.	J'ai déplacé la séance de dialyse d'un patient au planning et les traitements en séance pour celle-ci ont disparu, alors que la prescription n'a pas changé	49
5.2.	J'ai modifié la prescription d'un patient en séance, cependant cette modification n'est pas prise en compte dans la partie « Traitement en séance » de la feuille de dialyse du patient.	49
5.3.	Je cherche à ajouter un médicament / complément alimentaire / DM depuis la base VIDAL pour une prescription mais le bouton « Ajouter » n'apparaît pas, que faire ?	50
5.4.	Lorsque je prescris un médicament toutes les X semaines, la date de démarrage de la prescription n'est pas la bonne	51
5.5.	Une partie des traitements du patient ont été arrêtés	51

1. Généralités et vue d'ensemble

1.1. Introduction

Ce manuel d'utilisation s'adresse à des utilisateurs francophones d'Hemadialyse et en particulier aux médecins ainsi qu'aux pharmaciens des centres de dialyse équipés de la solution Hemasystem.

Hemadialyse est un outil de travail complet permettant de rassembler en un même logiciel métier les fonctions de suivi du dossier médical des patients en insuffisance rénale chronique, le suivi de leur hospitalisation, la gestion des courriers, bilans biologiques, la télésurveillance et la génération des feuilles de séances de dialyse.

Hemaweb est l'interface web d'Hemadialyse, vous permettant d'accéder à la plupart des fonctionnalités du logiciel depuis n'importe quel appareil via un navigateur web tel Google Chrome ou Firefox. Le module LAP est disponible également sur cette version, qui a été conçu pour se rapprocher au plus de la prescription sur Hemadialyse en y ajoutant l'ergonomie et la dynamique des interfaces web.

Parmi les fonctionnalités d'Hemadialyse, le logiciel comporte un module de prescription médicamenteuse, identifié HMD_LAP et permettant entre autres de lier la saisie de la prescription avec la base de données du médicament VIDAL pour sécuriser la prescription.

Ce manuel a pour but de décrire l'ensemble des paramètres utilisables pour configurer la prescription, configurer l'accès au serveur Vidal ainsi que de détailler le déroulé d'une prescription à travers toutes les fonctionnalités à disposition des prescripteurs et de la pharmacie.


Le module LAP d'Hemadialyse permet de :

- Pour les médecins :
 - Editer pour chaque patient une prescription médicamenteuse depuis une base de médicament liée à la base VIDAL
 - Réaliser à tout moment une vérification (dit « check Vidal ») de la prescription médicamenteuse à l'aide des informations à disposition du dossier patient (Age, sexe, pathologie chroniques, allergies ...) afin de relever les contre-indications, interactions médicamenteuses, cas de surdosage et les redondances médicamenteuses de la prescription.
 - Conserver un historique des traitements prescrits aux patients depuis le module ainsi que leur administration en cours de séance
 - Effectuer une recherche de produits au sein du livret de l'établissement mis à jour par les pharmaciens
- Pour les pharmaciens :
 - Être prévenu par mail lors de la modification des prescriptions des patients suivi
 - Gérer et éditer les médicaments au livret de l'établissement
 - Valider ou refuser l'ensemble de la prescription des patients suivis en se basant notamment sur les résultats du « Check Vidal »

M03d v1.0	Nom du document	Numéro de version	Date de dernière mise à jour	Page
	Manuel utilisation HMD LAP	1.2	21/04/2021	3/51

Le présent manuel d'utilisation, ainsi que l'ensemble de la documentation utilisateur pour l'utilisation des différents module d'Hemadialyse sont disponible depuis l'application via l'icône , voir capture d'écran :

Aides et Supports



Parcourez notre Base				
Nom	Taille	Dernier accès	Date de création	
DF01_HMD_V04_Manuel_Seance_de_dialyse_v1.0_20160201.pdf	2 Mo	08/04/2021 08:54:44	12/02/2016	11:03:03
DF02_HMD_V04_Kit_de_survie_v1.0_20160201.pdf	4 Mo	08/04/2021 08:59:40	12/02/2016	11:12:54
DF03_HMD_V04_Manuel_Planning_v1.0_20160204.pdf	3 Mo	08/04/2021 09:12:15	12/02/2016	11:07:15
DF04_HMD_V04_Manuel_Documents_et_Questionnaires_Types_v1.0_20160205.pdf	4 Mo	08/04/2021 09:13:45	09/03/2016	15:32:14
DF05_HMD_V04_Les_Messages_v1.0_20160212.pdf	2 Mo	24/03/2021 10:35:38	12/02/2016	11:14:12
DF06_HMD_V04_La_Navigation_v1.0_20160212.pdf	4 Mo	24/03/2021 10:36:20	09/03/2016	15:37:05
DF07_HMD_Dossier_Patient_v1.0_20160323.pdf	2 Mo	24/03/2021 11:14:15	31/03/2016	14:12:38
DF08_HMD_La_Biologie_v1.0_20160323.pdf	6 Mo	12/04/2021 14:15:01	31/03/2016	14:16:01
DT01_HMD_Utilisation_en_mode_degrade_v1.0_Rev_Juin2019.pdf	428 Ko	05/03/2021 20:04:02	01/07/2019	12:03:59
DT01bis_HMD_Plan_de_Continuite_d_Activite_PCA_v1.0_20141118.pdf	650 Ko	08/04/2021 09:02:57	13/04/2016	11:06:58
DT02_HMD_Passage_des_actes_codes_en_Dxx_en_GHSxx_v1.0_20130312.pdf	4 Mo	24/03/2021 11:03:37	04/12/2013	15:24:50
DT03_HMD_Parametrage_actes_GHS_pour_HMD_CEGI_v1.0_20130405.pdf	781 Ko	08/04/2021 09:16:30	04/12/2013	15:25:01
DT04_HMD_Export_HD_Report_v1.0_20130605.pdf	389 Ko	09/02/2021 16:55:15	04/12/2013	15:25:06
DT05_HMD_Edition_automatique_des_bons_de_transport_v1.0_20130712.pdf	2 Mo	18/03/2021 11:24:41	04/12/2013	15:25:37
DT06_HMD_Procedure_pour_cree_un_type_de_solution_DP_v1.0_20130801.pdf	827 Ko	08/04/2021 09:45:23	04/12/2013	15:26:34
DT07_HMD_Gestion_des_onlets_virtuels_v1.0_20130520.pdf	1 Mo	24/03/2021 11:19:13	04/12/2013	15:26:55
DT08_HMD_Edition_automatique_des_feuilles_de_soins_v1.0_20130719.pdf	1 Mo	24/03/2021 11:19:57	04/12/2013	15:27:21
DT09_HMD_Deroulement_theorique_install_HMD_en_service_de_dialyse_v1.0_20130827.pdf	629 Ko	24/03/2021 11:20:45	04/12/2013	15:27:30
DT10.1_HMD_Configuration_requise_install_HMD_avec_F615_v1.0_20130904.pdf	213 Ko	06/09/2019 11:31:33	04/12/2013	15:27:33
DT10.2_HMD_Configuration_requise_install_HMD_v1.0_20130909.pdf	954 Ko	05/06/2020 16:03:11	04/12/2013	15:27:46

Comment accéder à la doc utilisateur depuis HMD

Cette fonctionnalité n'est à ce jour pas disponible sur Hemaweb.

Si lors de l'utilisation du LAP via Hemadialyse ou Hemaweb vous rencontrez un quelconque problème, vous pouvez contacter le service hotline au 0825 890 531 afin que nous puissions vous apporter l'assistance nécessaire. Vous pouvez également accéder à l'assistance mail par l'icône  > HelpDesk Mail.

1.2. Prérequis

Le document DT26 décrit les conditions d'installations et les prérequis nécessaire à l'utilisation d'Hemadialyse en Client.

L'annexe 2 du présent document contient les instructions de paramétrage permettant de configurer le module sous son paramétrage de conformité LAP-H.



Ce paramétrage est le paramétrage revendiqué pour l'utilisation du module dans les bonnes conditions d'usages. EMA ne pourra être tenu responsable de tout problème lié à l'absence d'une alerte due à un changement de l'un de ces paramètres.

M03d v1.0	Nom du document	Numéro de version	Date de dernière mise à jour	Page
	Manuel utilisation HMD LAP	1.2	21/04/2021	5/51

2. Utilisation du module de prescription

2.1. Conditions d'accès à VIDAL depuis un poste


Pour interroger depuis son poste client la base médicamenteuse VIDAL publiée sur le réseau, l'utilisateur doit avoir la base HEMADIALYSE et son propre poste de saisie configurés (paramètres en page 2 de la fiche du poste de saisie) :

La zone « VidalSoap Host » contient l'adresse de publication du serveur VIDAL et de ses API (Bibliothèque de fonctions accessible via un Webservice).

Remarque : l'option « Autoriser le calcul dynamique des IAM et IC » permet le calcul automatique des interactions, contre-indications et incompatibilités au sein des prescriptions médicamenteuses d'un patient sélectionné dans HEMADIALYSE et la mise à jour de la pastille dans la partie « Détails » de la fenêtre de navigation (à gauche).

Remarque : l'option « Autoriser la recherche dynamique des médicaments » permet de lancer automatiquement la recherche d'un médicament depuis l'écran générique de recherche sitôt que l'utilisateur saisit des caractères dans la zone de recherche de cet écran (au moins 5 caractères en recherche dans la BDM et dès le premier caractère en recherche dans la bibliothèque locale des médicaments) et sans qu'il ait besoin de cliquer sur la loupe pour lancer sa recherche.

M03d v1.0	Nom du document	Numéro de version	Date de dernière mise à jour	Page
	Manuel utilisation HMD LAP	1.2	21/04/2021	6/51



Puis cliquer sur :
Puis



Postes

Postes

3 / 61

Services attribués au poste

 Serveur_Hem
 PCP-DUPRE
 0021cc72950d
 0021cc72aa8c

Sélectionner le poste utilisateur en double cliquant

VIDAL

VIDAL HOPTIMAL

Test le lien

VidalSoap Host : 192.168.1.169:8011

Autoriser le calcul dynamique des IAM et IC : ☐

Autoriser la recherche dynamique des médicaments : ☐

Ce paramètre est disponible en page 2

Accéder au paramétrage de l'accès au Vidal sur Hemadialyse

Fonctions

- Planning
- Séances de Dialyse
- Biologie
- Bibliothèques de base
 - Gestion des énumérations
 - Examens biologiques types
 - Bilans biologiques types
 - Exams non biologiques types
 - Médicaments
 - Médecins
 - Infirmier(e)s
 - Etablissements
 - Caisses
 - Villes
- Exploitation des données
- Paramétrage
 - Gestion des utilisateurs
 - Les Traitements**
 - Plannings
 - Paramètres généraux
 - Télésurveillance
 - LDAP
 - Transmissions Ciblées

Puis en page 2 :

Traitements
Vidal
Ordonnances
Pharmacie

Adresse du serveur VIDAL HOPTIMAL : 192.168.1.169:8011

Dernière version en ligne de la BdM Vidal synchronisée : 2021.2.0 19/01/2021

Autoriser la mise à jour automatique de la bibliothèque médicamenteuse : ☒

Mode de vérification VIDAL : vérification en fin de saisie

Autoriser le calcul des interactions médicamenteuses : ☒

Autoriser le calcul des contre-indications : ☒

Autoriser le calcul des incompatibilités physico-chimiques : ☒

Autoriser le calcul des contre-indications allergiques : ☒

Activer le contrôle d'outrepassement des doses et des durées : ☒

Activer le contrôle de la sécurisation des traitements : ☒

Enregistrer les modifications

Accéder au paramétrage des traitements sur Hemaweb

Note : Pour Hemaweb, ce paramétrage est effectué coté serveur. La page accessible depuis le navigateur ne fait qu'afficher l'état du serveur et des APIs VIDAL.

Hemadialyse uniquement :

Le niveau d'accès de l'utilisateur doit aussi être paramétré pour lui permettre d'utiliser dans les différents écrans d'HEMADIALYSE les appels possibles au VIDAL (Paramétrage > Accès > page « fonctions » > fonction « Accéder au VIDAL » cochée).

Dans l'ensemble des écrans de l'application, si le paramétrage d'utilisation du VIDAL depuis HEMADIALYSE ou Hemaweb est correct, l'utilisateur dispose d'une icône caractéristique du VIDAL :



ou



Si le VIDAL est inaccessible depuis ce poste, les icônes caractéristiques du VIDAL sont alors :  ou  sur Hemadialyse. Sur Hemaweb, un message d'erreur est généré lors de l'accès à la page des traitements.


2.2. Consulter la liste des traitements du patient

Pour prescrire un médicament à un patient, le médecin doit sélectionner ce patient et cliquer sur

l'icône  (Hemadialyse) ou  (Hemaweb) dans la partie « Quick View » du navigateur.

Note : L'icône peut être surlignée en rouge ou en jaune sur Hemadialyse : Cela signifie qu'un ou plusieurs éléments de la prescription sont à revoir (date de fin dépassée ou proche par exemple).

L'ensemble des traitements médicamenteux en cours du patient s'affiche alors :



ANGELVY Andre homme - 50 ans - né le 10/09/1930 - présent - 1902 / 201909607
 Repli - 70,5 kg - Hémodialyse - 4405 - poste habituel 2


7 Traitement(s) actif(s) (0/7) 13 Traitement(s) arrêté(s)

COMMENTAIRES PHARMACIE au 14/10/2019 : GK/GKTHV

date début	date fin	médecin	type	posologie	commentaires / motif
06/08/2020		BORELLI	S	AUGMENTIN 1 g/125 mg Pdr susp buv 12Sach : poudre pour suspension buvable voie orale 1 sachet Lu Ma Me Je Ve Sa Di acide clavulanique (sel de K) * 125 mg - amoxicilline * 1 g ; pdr p susp buv sach Réévaluation médicamenteuse à 48h demandée par BORELLI le 06/08/2020. Réévaluation médicamenteuse à 96h demandée par BORELLI le 06/08/2020.	
17/03/2021	365 jours	AL ASSAF	S	Contension : 1 pendant 365 jours sur le bras	
29/11/2017		BORELLI	S	DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plq/8 : comprimé voie orale 1 comprimé Lu Ma Me Je Ve Sa Di paracétamol * 1 g ; cp	
17/02/2021	365 jours	AL ASSAF	S	DOLIPRANE 200 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach : poudre pour solution buvable voie orale 1 sachet pendant 365 jours paracétamol * 200 mg ; pdr p sol buv sach	
29/10/2019		BORELLI	S	FRAXIPARINE 1900 UI AXa/0,2 ml S inj en seringue préremplie SC 10Ser préremplies/0,2ml : solution injectable voie intra-artérielle DOSE D'ENTRETIEN 1900 UI Lu Ma Me Je Ve Sa Di nadroparine calcique * 1900 UI AXa/ml	
29/10/2019		BORELLI	S	FRAXIPARINE 5700 UI AXa/0,6 ml S inj SC 10Ser/0,6ml : solution injectable voie intra-artérielle DOSE DE CHARGE 5700 UI Lu Ma Me Je Ve Sa Di nadroparine calcique * 5700 UI AXa/ml	
07/10/2017		BORELLI	S	MIRCERA 75 µg/0,3 ml S inj en seringue préremplie 1Ser/0,3ml : solution injectable voie intraveineuse 75 µg Lu Ma Me Je Ve Sa Di méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta * 75 µg/ml	

prescripteur
AL ASSAF - N° RPPS : 888888888888

Affichage des traitements en cours sur Hemadialyse



ANDRAL Lucien Homme - 92 ans - né(e) le 09-11-1928 - Présent(e) - 1901/202025698
 Résident - 0kG (Depuis 29-11-2017) - Hémodialyse - 4405 - Poste habituel 1

Liste des traitements du patient

Traitement(s) Actif(s) Traitement(s) Arrêté(s)

Debut	Fin	Médecin	Type	Posologie	Actions
05-08-2020	indéterminé	AL ASSAF	V	DOLIPRANE 100 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach : poudre pour solution buvable voie orale 1 sachet par jour	
03-11-2020	03-11-2020	AL ASSAF	S	FRAXIPARINE 3800 UI AXa/0,4 ml S inj SC 10Ser/0,4ml : solution injectable intra-artérielle 3800 UI pré-dialytique	
23-10-2020	27-10-2020	AL ASSAF	S	NEO-CODION Cpr enr B/20 : comprimé enrobé orale 1 comprimé pré-dialytique	
27-09-2018	indéterminé	BORELLI	S	ARANESP 150 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0,3ml : solution injectable voie intraveineuse 0,3 ml Lu 0,3 ml Je 0,3 ml Di	
08-06-2020	indéterminé	AL ASSAF	S	ARANESP 40 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0,4ml : solution injectable voie intraveineuse 0,4 ml Lu Ma Me Je Ve Sa Di	
25-05-2020	indéterminé	DEREINS	S	AUGMENTIN 1 g/200 mg Pdr sol inj IV adulte FV/10 : poudre pour solution injectable voie intraveineuse 1 flacon Réévaluation médicamenteuse à 48h demandée par DEREINS le 25/05/2020. Réévaluation médicamenteuse à 48h demandée par DEREINS le 25/05/2020. Réévaluation médicamenteuse à 96h demandée par DEREINS le 25/05/2020.	
25-05-2020	indéterminé	DEREINS	S	CLAMOXYL 1 g Cpr disp B/14 : comprimé dispersible voie orale 1 comprimé Réévaluation médicamenteuse à 48h demandée par DEREINS le 25/05/2020. Réévaluation médicamenteuse à 96h demandée par DEREINS le 25/05/2020.	
20-12-2018	indéterminé	BORELLI	S	DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plq/8 : comprimé voie orale 1 comprimé Lu Ma Me Je Ve Sa Di	
18-05-2020	indéterminé	AL ASSAF	S	FER MYLAN 100 mg/5 ml S diluer perf 5Amp/5ml : solution à diluer pour perfusion voie intraveineuse 100 mg Me toutes les 2 semaines	

Affichage des traitements en cours sur Hemaweb

Depuis cet écran, le prescripteur dispose de :

- En haut, un résumé du patient (nom, prénom, âge, poids, taille, sexe et sa situation au centre de dialyse).
- En bas de page, les informations concernant le prescripteur courant.
- En première page, la liste des prescriptions médicamenteuses en cours du patient ; cette liste est triée par défaut par type de prescription (« hors séance », puis « pendant séance », d'abord les « avant dialyse » puis les « pendant dialyse » et enfin les « après dialyse ») et par ordre alphabétique pour chaque type. Cette liste peut être aussi triée par nom ou par classe ATC.
- En page 2, la liste des prescriptions médicamenteuses arrêtées du patient, triée par date d'arrêt. Cette liste peut aussi être triée par type de prescription (« hors séance », puis « pendant séance », d'abord les « avant dialyse » puis les « pendant dialyse » et enfin les « après dialyse ») et par ordre alphabétique pour chaque type, par nom ou par classe ATC.

2.2.1. La liste des traitements médicamenteux actifs

Chaque ligne figurant dans cette liste correspond à une prescription médicamenteuse en cours pour le patient ; une prescription peut être courante pour un patient alors que la date de fin de prescription est dépassée. Dans chacune de ces lignes, on trouve, de gauche à droite :


- Médicament classé comme dopant 
- Médicament classé comme un générique 
- Médicament ne se trouvant pas dans la bibliothèque VIDAL (prescription non sécurisée) ( ou )
- Médicament prescrit « hors Autorisation de Mise sur le Marché » (hors AMM) ( ou )
- Médicament présent au livret de l'établissement ( ou )
- Date et heure de début de la prescription
- Date de fin et durée en jours de la prescription
- Indication de mise en garde de traitement proche de la date de fin de prescription (durée paramétrable, cf §3.2.1)
- Nom du médecin prescripteur
- Prescription en ville (V) ou en séance (S)
- Médicament classé comme une perfusion ( ou )
- Médicament classé comme fourni par le patient ( ou )
- Médicament classé comme non substituable 
- Médicament validé ou refusé par la pharmacie (avec commentaire ou non)
 (HMD :  =Validé  =Refusé  =Statut encore non obtenu  =Validation/Refus avec un commentaire de la pharmacie)
- Médicament validé ou refusé par la pharmacie (avec commentaire ou non)
 (HMW :  =Validé  =Refusé  =Statut encore non obtenu  =Validation/Refus avec un commentaire de la pharmacie)
- La posologie du traitement

Les lignes sur fond vert foncé correspondent à des médicaments prescrits en urgence.

Les lignes écrites en italique correspondent à des prescriptions non sécurisées (prescriptions libres ou sans code CIP ou en Dénomination Commune (DC)).

Remarque : (Hemadialyse uniquement) Les lignes peuvent être affichées plus grandes et d'une hauteur optimisée selon la posologie la plus longue. Pour cela, il faut modifier le paramétrage des traitements. Ce paramétrage est général, autrement dit commun à tous les utilisateurs et à tous les centres associés à la base.


Note : Chacun de ces paramètres est associé à une ou plusieurs icônes/code couleur. La légende est accessible via ces icônes en haut à droite :



Note : Les légendes des icônes utilisées sont disponibles en Annexe 1 (Légende icônes Hemadialyse et Hemaweb).

2.2.2. Modification/arrêt d'un traitement

- Le bouton  ou  permet d'arrêter la prescription. En cliquant sur ce bouton, un écran de saisie s'affiche pour saisir un commentaire (facultatif) et préciser le mode d'arrêt (la date d'arrêt est forcément la date du jour) ; en cas d'arrêt en urgence une éphéméride est générée pour signaler cette modification de prescription à tout utilisateur accédant au dossier du patient :



- Ces boutons  ou  permettent de modifier un traitement prescrit (si l'utilisateur a des droits de modification). En cliquant sur ce bouton, l'utilisateur ouvre l'écran de prescription détaillée où s'affichent les valeurs courantes de la prescription médicamenteuse à modifier.

- Ces boutons  ou  permettent de prolonger un traitement prescrit (si l'utilisateur a des droits de modification). En cliquant sur ce bouton, une fenêtre de dialogue simple s'ouvre avec la possibilité de saisir une nouvelle date pour le renouvellement de la prescription. Cette date est limitée à un an à compter de la date du jour et on propose d'ajouter un commentaire au renouvellement.

2.2.3. Barre d'outils horizontale




Depuis la liste des traitements médicamenteux actifs du patient, l'utilisateur dispose selon ses droits des icônes suivantes (situées au-dessus de la liste) :

-  ou  permet de lancer le calcul des interactions, des contre-indications et/ou des incompatibilités physico-chimiques pour ce patient. Une puce colorée peut être associée à l'icône donne le niveau d'alerte retourné par VIDAL. Exemple : 
-  ou  s'affiche si des allergies sont connues pour ce patient.
-  ou  permet aux pharmaciens de valider l'ensemble des prescriptions médicamenteuses en cours du patient en y ajoutant éventuellement un commentaire.
-  ou  permet aux pharmaciens de désapprouver l'ensemble des prescriptions médicamenteuses en cours du patient en y ajoutant éventuellement un commentaire.
-  ou  permet de générer manuellement un fichier PDF récapitulant l'ensemble des prescriptions médicamenteuses du patient (Sur Hemadialyse, la fonction nécessite l'installation et le paramétrage préalables de « PDFCreator » sur le poste CLIENT).
-  permet d'imprimer l'ensemble des prescriptions courantes du patient. (Hemadialyse uniquement)
-  permet de visualiser sous forme de courbes les prescriptions et les administrations des traitements de type « Epo », « Fer » ou « héparine » en regard des données de biologie du patient de type « PTH », « Calcium », « Phosphore » ou « Vitamine D ». (Hemadialyse uniquement, visible quand on sélectionne un médicament compatible)
-  ou  permet d'arrêter l'ensemble des prescriptions courantes du patient.
-  permet de voir les médicaments de substitution pour un traitement médicamenteux choisi dans la liste des prescriptions médicamenteuses du patient (Hemadialyse uniquement)
-  permet d'ajouter une prescription en saisie libre (option paramétrable). (Hemadialyse uniquement)
-  permet d'ajouter une perfusion. (HMD) (pour HMW d'abord sélectionner l'icône  (ajout de traitement) puis sélectionner l'option « perfusion »)
-  ou  permet d'ajouter une prescription médicamenteuse.


2.2.4. Afficher le détail d'une prescription

Depuis la liste des traitements médicamenteux actifs du patient, l'utilisateur peut cliquer sur une des prescriptions de la liste et il voit alors s'afficher - sans possibilité de modifier - les informations détaillées de cette prescription :




The screenshot shows the Hemadialyse interface with a detailed view of a prescription. The main area displays the prescription details for DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plq/8, including the date of prescription (29/11/2017), the prescriber (BORELLI), and the patient (AL ASSAF). The prescription is for a 365-day duration, with a daily dose of 1 comprimé. The interface includes various fields for administration details, such as the date of start, date of end, and duration. It also shows the patient's medical history and the status of the prescription (active or stopped).

Sur Hemadialyse, le dialogue s'affiche en bas de la page, par-dessus la liste des traitements



The screenshot shows the Hemadialyse interface with a detailed view of a prescription for MIRCERA 75 µg/0,3 ml S inj en seringue préremplie. The main area displays the prescription details, including the date of prescription (29/11/2017), the prescriber (BORELLI), and the patient (AL ASSAF). The prescription is for a 365-day duration, with a daily dose of 1 comprimé. The interface includes various fields for administration details, such as the date of start, date of end, and duration. It also shows the patient's medical history and the status of the prescription (active or stopped).

Sur Hemadialyse, d'autres informations sont disponibles si on sélectionne un traitement arrêté (date de fin par exemple)



The screenshot shows the Hemaweb interface with a detailed view of a prescription for ASPIRINE UPSA VITAMINE C Cpr eff tamponnée effervescente. The main area displays the prescription details, including the date of prescription (12-04-2021), the prescriber (ANGELVY ANDRE), and the patient (AL ASSAF). The prescription is for a 2-day duration, with a daily dose of 1 comprimé. The interface includes various fields for administration details, such as the date of start, date of end, and duration. It also shows the patient's medical history and the status of the prescription (active or stopped).

Sur Hemaweb, les informations s'affichent dans un cadre « flottant » par-dessus la page web

BESOMBES Guy 145 semaine(s)

Spécialité: AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg Cpr pell adulte B/16
DC: acide clavulanique (sel de K) * 62,5 mg + amoxicilline * 500 mg
Code CIP: 3533702 - Code UCD: 9217764
Prix unitaire: €

HOPTIMAL 2021.2.0 19/01/2021

Type: 1 comprimé

Checksum: quantité totale = 1 - dosage total = 1

Non Substituable ☐
hors ALD ☐
hors AMM ☐

validation le 27-06-2018 à 17:13 (DEREINS)

Fermer

Même méthode pour les traitements arrêtés sur Hemaweb

2.3. Saisie d'une prescription médicamenteuse

Pour ajouter un traitement médicamenteux, le prescripteur clique sur l'icône  ou . Il voit alors s'afficher un écran lui permettant de choisir le médicament à prescrire :

HORS SEANCE

ANGELVY Andre - homme - 90 ans - né le 16/09/1930 - présent - 1902 / 20190607
Repi - 70,5 kg - Hémodialyse - 4405 - poste habituel 2

recherche de médicament(s) par spécialité thérapeutique ☒ dans la BDM

CIP Médicament

CIP	Médicament	Prix
3400935678133	ARANESP 10 µg S inj en seringue préremplie Ser/0,4ml	12,14 €
340093562965	ARANESP 100 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0,5ml	121,36 €
3400935693128	ARANESP 150 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0,5ml	157,77 €
3400935693357	ARANESP 150 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0,3ml	182,03 €
3400935691575	ARANESP 20 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0,5ml	24,26 €
3400935692000	ARANESP 40 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0,4ml	45,53 €
3400935692237	ARANESP 50 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0,5ml	60,68 €
3400935693708	ARANESP 500 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/1ml	606,80 €
3400935692527	ARANESP 60 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0,3ml	72,81 €
3400935692756	ARANESP 80 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0,4ml	97,09 €

11 médicaments trouvés

spécialité: ARANESP 300 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0,6ml
DC: darbepoétine alfa * 500 µg/ml ; 5 inj
CIP: 3400935693566 UCD: 340093356218 prix: 364,08 €
code ATC: B03XA02 - DARBEPOETINE ALFA
B03XA - AUTRES PREPARATIONS ANTIANEMIEQUES
B03X - AUTRES PREPARATIONS ANTIANEMIEQUES
B03 - PREPARATIONS ANTIANEMIEQUES
B - SANG ET ORGANES HEMATOPOIETIQUES

HOPTIMAL 2021.2.0 (19/01/2021)

annuler ajouter

Ajout d'un traitement sur Hemadialyse

BESOMBES GUY

Homme - 59 ans - né(e) le 18-02-1962 - Présent(e) - 1909/9002241
74kg (Depuis 02-03-2017) - DP (DPA) - Poste habituel 0

Recherche: par spécialité pharmaceutique

Mode d'affichage et de prescription: Spécialité DC

Traitement(s) Actif(s) (3)

DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plg/8 3.00 comprimé par jour (1 comprimé le matin / 1 comprimé la journée / 1 comprimé le soir / pendant le repas)

MIRCERA 100 µg/0,3 ml S inj en seringue préremplie 1Ser/0,3ml - solution injectable voie intraveineuse 100 µg par jour

DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plg/100 comprimé voie orale 1 comprimé Ma Je Sa

CIP	Médicament	Prix unitaire
3400956092895	CODOLIPRANE 400 mg/20 mg Cpr séc adulte Plg/100	
3400402737936	DOLICHOS PRURIENS 15CH TUBE GRANULES 4G ROCAL	0.91€
3400934988331	DOLIPRANE 100 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach	1€
3400956329922	DOLIPRANE 1000 mg Cpr eff séc B/100	
3400935294227	DOLIPRANE 1000 mg Cpr eff séc T/8	0.76€
3400956369553	DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plg/100	
3400935955838	DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plg/8	0.86€
3400941533969	DOLIPRANE 1000 mg Gél Plg/8	0.76€
3400936246980	DOLIPRANE 1000 mg Pdr sol buv en sachet-dose 8Sach	0.76€
3400933047467	DOLIPRANE 1000 mg Suppos adultes Plg/2x4 (8)	1.03€
3400934988799	DOLIPRANE 150 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach	1€
3400934999161	DOLIPRANE 200 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach	1€
3400934809866	DOLIPRANE 200 mg Suppos Plg/2x5 (10)	0.91€
3400934999451	DOLIPRANE 300 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach	1€

18 médicament(s)

Chargement. Veuillez patienter...

Affiner la sélection:

Spécialité: DOLIPRANE 1000 mg Cpr eff séc B/100

ansm SMR/ASMR

Ajout d'un traitement sur Hemaweb

Depuis cet écran, le prescripteur dispose d'un certain nombre d'informations par défaut :

- En haut, un résumé du patient (nom, prénom, âge, poids, taille, sexe et sa situation au centre de dialyse).

♂ ANGELVY Andre - homme - 90 ans - né le 16/09/1930 - présent - 1902 / 201909607
 Repli - 70,5 kg - Hémodialyse - 4405 - poste habituel 2

Hemadialyse

ANDRAL LUCIEN



Homme - 90 ans - né(e) le 09-11-1930 - Présent(e) - 1901/202025698
 Infection - 73kg (Depuis 29-11-2017) - Hémodialyse - - Poste habituel 1

EPO / 

Hemaweb

- En bas à gauche, les informations essentielles concernant le prescripteur courant.
- La liste des traitements en cours, hors séance et en séance (à gauche de la fenêtre).
- La prescription d'EPO et éventuellement sa dernière administration en séance (Hemadialyse : en bas à gauche | Hemaweb : Cliquer sur l'icône ).
- Les derniers résultats de biologie pour l'hémoglobine, la ferritine et le coefficient de saturation (Hemadialyse : en bas à gauche | Hemaweb : Cliquer sur l'icône ). En cliquant sur le tableau de biologie, le prescripteur voit ces informations en plus grand. Les examens affichés ici correspondent à ceux paramétrés dans la bibliothèque des examens biologiques types comme étant de type « Hb », « SF » ou « CST » (Cf. paramétrage des fiches « examen biologique type »).

Epo

31/08/2017

ARANESP (ARANESP 130 µg S
ini en seringue préremplie Ser

	12/12/2017	-	-
Hb	9,6	8,5	11,3
Ferritine	259,5	-	-
CST	22	-	-

AL ASSAF - N° RPPS : 8888888888888

EPO		
13-04-2021: ARANESP 100 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0.5ml (prescrit)		
13-04-2021: ARANESP 40 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0.4ml (prescrit)		
Biologie		
Valeur 1	Valeur 2	Valeur 3
HEMOGLOBINE: 9.6 (12-12-2017)	HEMOGLOBINE: 8.5 (30-08-2017)	HEMOGLOBINE: 11.3 (10-08-2017)
FERRITINE: 259.5 (12-12-2017)		
COEFFICIENT DE SATURATION: 22 (12-12-2017)		
Legende EPO: administré non administré Inconnu		

Hemadialyse / Hemaweb

Le prescripteur dispose aussi d'outils de recherche :

- une zone de saisie pour caractériser la recherche.
- un choix du mode de recherche (par spécialité thérapeutique, par Dénomination Commune (DC), par classe ATC, par nom ATC, par substance (molécule) ou par indication).
- la possibilité de rechercher : uniquement dans le livret (cocher la première case), dans toute la base locale (ne rien cocher) ou dans la bibliothèque de VIDAL (cocher « dans la BDM »).
- chaque colonne de la liste des résultats peut être triée par simple clic sur son titre.

par spécialité thérapeutique ▼
☒ livret
☐ dans la BDM

ABCDEFGHIJKLM*
 NOPQRSTUVWXYZ

par spécialité thérapeutique ▼
 par spécialité thérapeutique
 par DC
 par classe ATC
 par nom ATC
 par substance
 par indication

Une fois la recherche lancée et le résultat obtenu, le prescripteur peut cliquer sur un des médicaments trouvés pour avoir des informations détaillées sur celui-ci. Le détail s'affiche en dessous de la liste de traitements recherchés et contient :

- son nom en tant que spécialité.
- sa DC.
- ses codes d'identification (CIP13, UCD13) et son dernier prix unitaire référencé.
- sa codification ATC.
- des accès vers la monographie et les recommandations VIDAL via les boutons rouges à droite en bas de la fenêtre.
- Un bouton permettant d'afficher dans la liste la DC du médicament sélectionné (si la recherche est faite en spécialité) ou les spécialités de la DC sélectionnée (si la recherche est faite en DC).

spécialité : FER MYLAN 100 mg/5 ml S diluer perf 5Amp/5ml
 DC : fer (hydroxyde ferrique-saccharose) * 20 mg/ml ; sol diluer p perf
 CIP : 3400957403744 UCD : 3400893217405
 code ATC : B03AC - FER, PREPARATIONS PARENTERALES
 B03A - PREPARATIONS MARTIALES
 B03 - PREPARATIONS ANTIANEMIKES
 B - SANG ET ORGANES HEMATOPOIETIQUES








Hemodialyse

Spécialité : FER MYLAN 100 mg/5 ml S diluer perf 5Amp/5ml
 DC : fer (hydroxyde ferrique-saccharose) * 20 mg/ml
 CIP : 3400957403744 UCD : 9321740
 Code ATC : B03AC - FER, PREPARATIONS PARENTERALES
 B03A - PREPARATIONS MARTIALES
 B03 - PREPARATIONS ANTIANEMIKES
 B - SANG ET ORGANES HEMATOPOIETIQUES







Hemaweb

Signification des icônes et boutons affichés dans le détail :

-  Le médicament sélectionné est un stupéfiant (**Hemodialyse uniquement**)
-  Le médicament sélectionné est un dopant
-  Le médicament sélectionné est un générique
-  /  Le médicament sélectionné est à risque et/ou anticholinergique
-  La prise du médicament sélectionné a des conséquences pour la conduite automobile (peut avoir différentes couleurs en fonction de la contre-indication)
-  Le médicament sélectionné fait l'objet d'une prescription hospitalière ou d'une réserve hospitalière
-  Cliquez ici pour accéder aux protocole(s) spécifiques associés à ce médicament (**Hemodialyse uniquement**)
-  Cliquez ici pour accéder à l'évaluation SMR/ASMR du médicament sélectionné
-  Cliquez ici pour accéder à la fiche concernant le médicament sur le site de l'ANSM
-  /  Cliquez ici pour accéder à la monographie et aux recommandations d'utilisation VIDAL si le médicament possède les fiches correspondantes sur la bibliothèque VIDAL

Note : En cas de doute sur les caractéristiques d'un médicament, veuillez consulter la fiche médicament / monographie VIDAL ou ANSM si disponible.

Substitution : Si le médicament ne fait pas partie du livret thérapeutique de l'établissement mais qu'un médicament de même classe ATC ou de même groupe existe dans ce même livret, un bouton « remplacer » (pour la prescription en DC) ou « substituer » (pour la prescription en spécialité) s'affiche pour proposer l'échange au prescripteur.

substituer

annuler

ajouter

Note (config Hemaweb) : Le site peut être configuré de manière à afficher dans une colonne si le médicament est au livret ou non.


Le paramètre qui contrôle cette fonction est dans le fichier config.php, variable \$hmbSearchVidalLivret

0 : le logiciel ne renseignera pas si les médicaments trouvés sont au livret (gain de temps)

1 : le logiciel affichera différemment les médicaments au livret lors de la recherche dans la BDM.

Remarque : (Hemadialyse uniquement) La liste des traitements en cours s'affiche en permanence sur le côté. Les lignes de traitements sont surlignées avec une couleur spécifique s'il y a redondance avec le médicament sélectionné (par ordre de priorité) :

- En **orange** si le traitement correspond au même type que celui sélectionné (héparine ou Epo par exemple)
- En **rosé** s'il s'agit du même médicament que celui sélectionné et que celui-ci est présent dans la bibliothèque locale des médicaments
- En **bleu clair** si le traitement est de la même classe ATC que le médicament sélectionné



Une fois le médicament choisi, le prescripteur clique sur le bouton « valider » (en bas à droite de la fenêtre) et arrive alors sur l'écran de saisie de la prescription proprement dite :

HORS SEANCE 1
ASPIRINE UPSA VITAMINE C Cp

ANGELVY ANDRE - homme - 15 ans et 6 mois - né le 16/09/2005 - présent - 1902 / 201909607
Infection - 70,5 kg - Hémodialyse - UDM - poste habituel 2

ASPIRINE UPSA VITAMINE C Cpr eff tamponnée effervescente 2T/10
acide acétylsalicylique * 330 mg + acide ascorbique * 200 mg ; cp efferv

forme comprimé effervescent mode d'administration orale
UCD comprimé UCD [1]

[2] pendant séance [3] tous les jours de dialyse [4] durée max abs. : 3 jours doses min : 2 comprimés par jour doses max : 8 comprimés par jour doses max abs. : 9 comprimés par jour

date de début 14/04/2021 heure de début [4]
date de fin indéterminée durée
date de dernière administration date de prochaine délivrance lundi 19 avril 2021

EN SEANCE 6
DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plg/8
FRAXIPARINE 1900 UI A/Xa/0,2 n
FRAXIPARINE 5700 UI A/Xa/0,6 n
HEPARINE CHOAY 5000 UI/ml S
HEPARINE CHOAY 5000 UI/ml S
MIRCERA 75 µg/0,3 ml S inj en si

Epo 08/11/2019
MIRCERA (MIRCERA 75 µg/0,3 ml S inj en seringue préremplie)

Hb 12,7
Ferritine
CST

Docteur Georges DERENS - N° RPPS : 1234561000

[5] info compl. [6] motif [7] [8] posologie
voie orale 1 comprimé Lu Ma Me Je Ve Sa Di les semaines paires

[9] [10] hors AMM non substituable hors ALD fourni par le patient

probabiliste prescrit en urgence à arrêter en date de fin
annuler valider

Hemadialyse

Ajouter un médicament

ANDRAL LUCIEN Homme - 80 ans - né(e) le 05-11-1930 - Présent(e) - 1901/202025698
Infection - 73kg (Depuis 29-11-2017) - Hémodialyse - Poste habituel 1

Traitement(s) Actif(s) Pendant Séance (18)
FRAXIPARINE 3800 UI A/Xa/0,4 ml S inj SC 105ml/0,4ml : solution injectable intra-articulaire 3800 UI pralysalytique
NEO CODION Cpr env 8/20 : comprimé entrecaté orale 1 comprimé pralysalytique
ARANE SP 100 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie acébutolol 0,5ml : solution injectable voie intraveineuse 100 µg

Traitement(s) Actif(s) Hors Séance (3)
CLAMOXYL 1 g Cpr disp B14 : comprimé dispersible voie orale 1 comprimé par jour pendant 25 jours
DOLIPRANE 100 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach : poudre pour solution buvable voie orale 1 sachet par jour
DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plg/8 : comprimé voie orale 1 comprimé par jour tous les 2 jours pendant 62 jours

CLAMOXYL 500 mg/5 ml Pdr susp buv Fl/60ml
amoxicilline * 500 mg/5 ml

Unité de dispensation [1] UCD [2] ml

Hors Séance [2] tous les jours [3] Date de début 14-04-2021 [4] Heure de début
Date de Fin [4] durée
traitement pendant : 1 jour(s) [5] Calculer Date Fin

[6] Dose ml [7] X nbre de prise [8] X=1 [9] par jour [10] dose mode classique

Repas : non précisé Avant Pendant Après à jeun

Posologie : [7] date de prochaine délivrance

dosage total : 0 - quantité totale : 0 ml

[9] hors ALD fourni par le patient Non Substituable hors AMM à arrêter en date de fin

Forme : [7] Mode d'administration : orale Motif : [8]

Probabiliste Ajust du traitement en urgence
Verification Valid Annuler

Hemaweb

Le prescripteur peut choisir :

- l'unité de prescription (Unité Commune de Dispensation (UCD) par défaut). [1]
- s'il s'agit d'un traitement « en séance » ou « hors séance ». [2]
- la fréquence du traitement. [3]
- les dates de début et de fin, l'heure de début et la durée du traitement. [4]

- les moments de la journée pour la prise du médicament (pour les traitements « hors séance ») **[5]**
(Hemaweb : Sélectionner le champ « dose classique » et choisir « par moment »).
- les moments de la séance pour la prise du médicament (pour les traitements « en séance »). **[6]**
- des informations complémentaires que le prescripteur juge utiles de saisir. Attention ! Ces informations ne doivent concerner ni le dosage ni la fréquence de la prescription. **[7]**
- un motif de prescription. **[8]**
- Plusieurs options de prescription sont disponibles : **[9]**
 - o « hors AMM »
 - o « non substituable ». L'annotation « NON SUBSTITUABLE » apparaît alors en toutes lettres sur la ligne de prescription dans l'ordonnance.
 - o « hors ALD »
 - o Traitement fourni par le patient.
 - o Traitement probabiliste (c'est le cas en général des antibiotiques dont la poursuite de la prescription dépend du résultat d'un antibiogramme réalisé après une infection. Dans ce cas, si le prescripteur confirme sa prescription après résultat de l'antibiogramme, le traitement est dit « documenté »).
 - o Traitement prescrit en urgence. Dans ce cas, une éphéméride est générée pour le signaler aux utilisateurs d'Hemadialyse ou Hemaweb venant consulter les informations du dossier de ce patient. Si une séance est en cours pour ce patient avec une Hemabox, l'éphéméride apparaîtra sur l'interface utilisateur pour signaler de l'ajout en urgence.
 - o Si le traitement doit être automatiquement arrêté dès le lendemain de sa date de fin. (Cette option peut être paramétrée pour être automatique pour tous les traitements, cf **§3.3**)
- Hemadialyse uniquement : Il est possible d'ajouter un protocole spécifique à un traitement en cliquant sur le champ **[10]** puis sur « ajouter une pièce jointe ». La PJ est donc enregistrée pour ce traitement et est spécifique au patient. Si vous souhaitez supprimer une PJ ajoutée précédemment, cliquer sur la PJ dans la liste déroulante en maintenant CTRL enfoncé pour demander la suppression de la ligne.

Note 1 : La « Date de dernière administration » correspond à la dernière administration de ce traitement en particulier, et non de la spécialité en général. Ce champ est toujours vide lors de la création d'une nouvelle prescription.

Note 2 : au fur et à mesure que le prescripteur saisit sa prescription, la date de prochaine délivrance est calculée. Et si le prescripteur clique sur cette date, il verra aussi les dates suivantes de délivrance.

Note 3 : si le prescripteur ne fixe pas de fréquence pour un traitement en séance de type « tous les jours de dialyse » ou « certains jours de dialyse », cette prescription sera de fait donnée « toutes les semaines ». Si le traitement est de type « en séance » et « certains jours du mois », il sera prescrit par défaut (c'est-à-dire sans fréquence choisie par le prescripteur) « tous les mois ».

Une fois finie sa saisie, le prescripteur valide sa prescription en cliquant sur le bouton « valider » (en bas à droite de la fenêtre). Si ce bouton de validation ne s'affiche pas, c'est que le prescripteur n'a pas – encore – précisé la dose.

A la validation de la prescription, plusieurs contrôles peuvent s'effectuer :

- si le traitement prescrit est de type « Epo » ou « fer » et que le prescripteur n'a pas fixé de fréquence telle que « tous les 2 mois » ou « toutes les 3 semaines », une fenêtre s'affiche pour demander au prescripteur de confirmer ce manque de fréquence ou de modifier cela.
- un message s'affiche pour demander au prescripteur de confirmer la date de prochaine délivrance calculée en fonction des données saisies pour la fréquence de ce traitement.

- si la prescription outrepassse les doses et les durées minimales ou maximales, une alerte apparaît puis un autre dialogue donne la possibilité au prescripteur d'associer un commentaire à son choix d'outrepasser la dose et/ou la durée fixée(s) pour ce médicament (ces données « dose minimale efficace », « dose maximale », « durée minimale » et « durée maximale » sont fournies par le VIDAL en fonction du médicament en cours de prescription et des données personnelles et médicales du patient (âge, poids, sexe, PMSI)).

Pour valider la prescription, si elle est complète, appuyez sur le bouton « Valider » (HMD) ou « Vérification Vidal » (HMW) pour lancer le premier calcul VIDAL (statut VIDAL par défaut).

Un premier écran apparaît pour préciser le périmètre sur lequel VIDAL va pouvoir baser ses calculs. Cette fenêtre génère un avertissement si VIDAL n'est pas en mesure d'effectuer certains calculs, avec la justification (cas les plus courants : prescription « tous les jours », « en séance » sans précisez les jours ; prescription « Selon Protocole » ; Traitement sans code CIP ou prescrit en DC). Cette fenêtre rappelle également les allergies recensées sur lesquelles VIDAL va se baser pour son calcul.



VIDAL Services

CALE MEHDI - homme - 78 ans - né le 01/02/1943 - présent - 2112 / 202025700
165 cm - Hémodialyse - UDM - poste habituel 99


ATTENTION !
L'information suivante nécessaire pour certains contrôles de sécurité n'est pas renseignée :
le poids du patient

Le calcul de l'interaction ne sera donc pas complet.

Informations particulières

valider

[HMD]Alerte VIDAL initiale : Poids du patient non renseigné dans le dossier médical, le calcul sera donc incomplet.



VIDAL SVC

Vérification par Webservice Vidal des Interactions médicamenteuses, contre indications, incompatibilités Physico-chimiques, redondances de substances et Allergies.

ATTENTION, AUCUNE INTERACTION THERAPEUTIQUE N'EST RECHERCHÉE.

Informations Particulières

Allergie(s) connue(s) du patient prise(s) en compte par la BDM:
caoutchouc naturel
protéines de hamster

Valider **Annuler**

[HMW] Rappel des allergies lors du check VIDAL initial

Pour voir comment paramétrer les allergies ou les pathologies à prendre en compte dans le calcul VIDAL, se référer au paragraphe **§3.2 Editer le dossier patient**

2.4. Validation Pharmacie

Cette partie concerne exclusivement la validation d'une prescription médicamenteuse pour un patient à travers Hemadialyse. Pour plus d'information sur les différentes pages dédiées aux activités de la pharmacie, comme par exemple la dispensation nominative ou l'évaluation de consommation de produits en séance, veuillez consulter le manuel utilisateur spécifique DT28_Outils de gestion

pharmacie disponible depuis l'aide en ligne sur le logiciel via l'icône  .


Afin de pouvoir accéder pleinement aux fonctionnalités de la pharmacie, assurez vous de vous connecter sur un compte ayant les droits nécessaire et associé à la boîte mail de Pharmacie configuré pour votre établissement.

Il existe deux méthodes dédiées pour valider ou refuser la prescription des patients :

2.4.1. Depuis la page Traitements

Par défaut, lors de l'ajout d'une nouvelle prescription, le statut de validation est laissé indéterminé et un mail est envoyé à la boîte « Pharmacie » définie dans le paramétrage de la base et/ou de l'établissement (cf §3.3).

Une fois le patient souhaité sélectionné, accédez à la page des traitements en cours avec  ou .



The screenshot shows the 'Traitements' page for patient ANDRAL LUCIEN. The page lists various medications and their dosages, with a red circle highlighting the 'VALIDER' (Validate) button next to the first entry.

En cliquant sur l'icône de croix depuis une ligne de traitement, vous pouvez prendre une décision quant à la validation ou au refus de cette prescription :

Hemodialyse | Hemaweb

Que vous validiez ou non la prescription, vous avez la possibilité de renseigner un commentaire pour expliquer votre décision. (Sur Hemaweb avec la fenêtre précédente, sur Hemadialyse avec la fenêtre suivante)

Note : Si un commentaire est saisi pour une ligne de prescription à la validation/désapprobation, l'icône du statut de la prescription change :  sur Hemodialyse et  sur Hemaweb.

M03d v1.0	Nom du document	Numéro de version	Date de dernière mise à jour	Page
	Manuel utilisation HMD LAP	1.2	21/04/2021	22/51

Lorsque vous refusez la prescription, si votre profil a les droits de modification / arrêt de traitement, Hemadialyse vous propose d'arrêter le traitement refusé directement, voir de l'arrêter en urgence. Si le traitement est arrêté en urgence, une éphéméride correspondante sera générée pour tous les utilisateurs se connectant sur le profil de ce patient.

Mr ANDRAL LUCIEN (1901) né le 09/11/1928

Voulez-vous arrêter ce traitement ("ARANE SP 150 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0.3ml") ?

Cette option n'apparaît que sur Hemadialyse

Il est également possible depuis cette page de valider ou désapprouver l'ensemble de la prescription du patient en cliquant sur ces icônes :   et  

ANGELVY ANDRE homme - 90 ans - né le 16/09/1930 - présent - 1902 / 20190907
 Repli... 4405 - poste habituel 2

11 Traitement(s) actif(s) (0/11) 18 Traitement(s) arrêté(s)

Hemadialyse

ANDRAL LUCIEN EPO / b

Homme - 92 ans - né(e) le 09-11-1928 - Présent(e) - 1901/202025696
 Résident - 79KG (Depuis 29-11-2017) - DP (DPA) - 4405 - Poste habituel 1

Hemaweb



Ces icônes permettent de valider ou désapprouver l'ENSEMBLE de la prescription du patient. Sur Hemadialyse, cette fonction écrase toute précédente décision de la pharmacie (mais conserve les commentaires)

Lorsque vous prenez une décision globale, un mail (messagerie Hemadialyse) est automatiquement envoyé aux médecins concernés par les prescriptions de ce patient.

Avant de prendre une décision, il vous est proposé de laisser un commentaire global :

ANGELVY ANDRE (1902) né le 16/09/1930

Prescriptions de ANGELVY ANDRE (1902) né le 16/09/1930 Commentaires Validation Pharmacie

Ceci est un commentaire global

BASE RECETTE BASE RECETTE BASE RECETTE

Sur Hemadialyse

Nombre de traitement impacté: 3

Validation Pharmacie:

☒ Oui ☐ Non

Veuillez saisir un commentaire pour ces validations

Pharmacie:

Ceci est un commentaire global

Sauver

Annuler

Hemaweb


Note : Sur Hemaweb, les décisions de la pharmacie ne peuvent être changées a posteriori sans modifier la ligne de traitement (auquel cas la décision de la pharmacie est réinitialisée).

Cela concerne également la fonction Arrêt/Validation de TOUS les traitements, qui ne peut écraser d'autres décisions sur Hemaweb.

2.4.2. Depuis la messagerie Hemadialyse

Lorsque vous êtes connecté sur un compte associé à la messagerie de la pharmacie, vous recevrez sur votre boîte mail Hemadialyse (accessible via l'icône  en haut à droite de la fenêtre) une notification lors de chaque ajout, modification ou arrêt d'un traitement pour tous les patients de votre établissement.

Les traitements arrêtés ou prescrits en URGENCE apparaissent différemment :



Hemadialyse MAIL - 101 messages reçus non lus

Marion Pharmacie

Date	Heure	Expéditeur	Sujet	Patient
06/05/2021	15:55:23	AL ASSAF	BASE RECETTE - Traitements médicamenteux : arrêt d'urgence	ANGELVY ANDRE
06/05/2021	15:55:23	AL ASSAF	Traitements médicamenteux : ajout	ANGELVY ANDRE
06/05/2021	15:25:48	AL ASSAF	Traitements médicamenteux : prolongation	ANGELVY ANDRE
30/04/2021	16:50:46	hdmv	BASE TEST - Traitements médicamenteux : ajout	TEST NEPHROPATHIE 1
30/04/2021	16:35:16	hdmv	BASE TEST - Traitements médicamenteux : modification	TEST NEPHROPATHIE 2
30/04/2021	16:32:02	hdmv	BASE TEST - Traitements médicamenteux : prolongation	TEST NEPHROPATHIE 2
30/04/2021	16:27:49	hdmv	BASE TEST - Traitements médicamenteux : ajout	TEST NEPHROPATHIE 2
30/04/2021	15:35:43	hdmv	BASE TEST - Traitements médicamenteux : ajout	TEST NEPHROPATHIE 2
29/04/2021	20:03:36	TEST	BASE TEST - Traitements médicamenteux : ajout	TEST NEPHROPATHIE 2
21/04/2021	15:02:37	hdmv	BASE RECETTE - Traitements médicamenteux : ajout	TEST NEPHROPATHIE 2
21/04/2021	11:45:06	AL ASSAF	Traitements médicamenteux : arrêt	TEST NEPHROPATHIE 2

Date: 06/05/2021 Expéditeur: AL ASSAF
Sujet: Traitements médicamenteux : ajout

101 messages reçus non lus


Messagerie Pharmacie sur Hemadialyse

Lorsque vous sélectionnez un mail concernant l'ajout, l'arrêt ou la modification d'un traitement, deux croix apparaissent en haut de la fenêtre  .

Ces croix permettent de valider ou refuser au cas par cas tous les traitements en attente de validation reçu sur votre boîte mail :

Au clic, ces fenêtres s'affichent :

2.4.2.1. Validation




1ère fenêtre : Validation d'un médicament depuis la messagerie HMD

2ème fenêtre : Validation dans le cas d'un patient ayant plusieurs médicaments en attente de validation

Dans le second cas, vous avez le choix entre tous les traitements, auquel cas vous recevrez tous les messages suivants pour chaque traitement, ou seulement certains, auquel cas HMD vous demandera pour chaque traitement si vous souhaitez prendre une décision.

Si vous acceptez, vous aurez la possibilité pour chaque ligne de prescription de saisir un commentaire pour cette validation :

2.4.2.2. Désapprobation

Le déroulé de la désapprobation depuis cet écran suit la même logique que pour la validation, avec cependant d'autres possibilités pour avertir de votre désapprobation.

Pour chaque ligne de traitements, vous aurez la possibilité d'envoyer :

- Un mail au néphrologue responsable du patient (défini dans le dossier patient, 1^{er} onglet)
- Un mail au néphrologue ayant prescrit ce traitement
- Une éphéméride, qui sera consultation pour tous les utilisateurs qui se connecteront sur le profil de ce patient.
- Ajouter un commentaire à la désapprobation visible sur l'écran des traitements du patient 
- Comme lors du refus depuis la page traitement, si vous avez les droits d'accès suffisants, vous pourrez arrêter le traitement correspondant de la prescription courante.

Voici un exemple de l'éphéméride générée depuis la messagerie pour une désapprobation pharmaceutique :

3 éphéméride(s) non délivrée(s)

08/05/2021	12:30 Réévaluation médicamenteuse à 48h du traitement "BACTRIM Cpr adulte B/20".
06/05/2021	12:32 désapprobation pharmacie - traitement : BACTRIM Cpr adulte B/20
07/05/2021	14:14 désapprobation pharmacie - traitement : DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plq/8

BACTRIM Cpr adulte B/20 : comprimé voie orale 1 comprimé par jour tous les 2 jours	
Prescription désapprouvée par la pharmacie le 06/05/2021 à 12:31 par Marion Pharmacie.	
Commentaire saisi par Marion Pharmacie pour cette désapprobation :	
BACTRIM Cpr adulte B/20 : comprimé voie orale 1 comprimé par jour tous les 2 jours : Test nephro prescripteur	

Cette éphéméride s'affichera sur tous les écrans concernés pour ce patient tant qu'elle n'aura pas été marquée comme « délivrée ».

Pour plus de détail concernant le fonctionnement des éphémérides, consultez le document utilisateur disponible via Hemadialyse : DT48_HMD_Ephemerides_V04.

3. Paramétrage relatif au LAP

3.1. Bibliothèques et référentiels des médicaments


Pour accompagner le médecin lors de la prescription de médicaments à un patient, l'application HEMADIALYSE s'appuie sur :

- La bibliothèque locale intégrée à la base de données HEMADIALYSE.
- La base médicamenteuse VIDAL (HOPTIMAL) publiée sur un serveur spécifique sur le réseau informatique et disponible depuis le poste client HEMADIALYSE.

La base médicamenteuse VIDAL permet d'enrichir la bibliothèque locale des médicaments et d'obtenir des données précieuses sur d'éventuelles interactions, contre-indications, allergiques ou non, et/ou incompatibilités physico-chimiques.

L'ajout de médicament depuis la base VIDAL vers la base locale se fait via l'intermédiaire du code CIP du médicament : C'est ce qui permet de garantir le lien entre le médicament dans la base locale et sa fiche détaillée dans la base VIDAL.

Pour consulter la bibliothèque locale des médicaments, l'utilisateur doit sélectionner la ligne « Médicaments » dans la fenêtre du navigateur dans la partie « Gestion des bibliothèques de base »



Accès bibliothèque Médicament sur Hemadialyse



Accès bibliothèque Médicament sur Hemaweb

Dans cette bibliothèque médicamenteuse locale, l'utilisateur pourra trouver des médicaments comme leur dénomination commune (DC) :

TOUT A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z			
		<Aucune>	<Aucune>
Médicaments			
Nom médicament	forme	DC	au livret
3 CHENES PROPOLIS Sirop FI/200ml	sirop		
3 CHENES PROPOLIS Spray gorge FI/25ml	spray		
ABSOSOLINS Set de perfusion voie veineuse périphérique B/1	set		
ACCUSOL 35 POTASSIUM 2 mmol/l S p hémofiltration 2Poches/5l	solution pour hémofiltration calcium chlorure dihydrate * 0,00025 g/ml ; voie ext		
ACICLOVIR BIOGARAN 5% Cr T/10g	crème	aciclovir * 5 %	
ACICLOVIR CRISTERS 5 % Cr T/10g	crème	aciclovir * 5 %	
ACIDE ALENDRONIQUE ALTER 70 mg Cpr pell Plq/12	comprimé pelliculé	acide alendronique (sel monosodique) * 70 mg	
ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg Cpr Plq/30	comprimé	acide folique * 0,4 mg	
ACIDE FOLIQUE CCD 5 mg Cpr Plq/20	comprimé	acide folique * 5 mg	
ACTILYSE 20 mg Pdre/solv p sol inj FI pdre+FI solv/20ml	poudre et solvant pour sol altéplase * 20 mg		
ACTISKENAN 20 mg Gél B/14	gélule	morphine sulfate * 20 mg	
ACTISKENAN 30 mg Gél Plq/14	gélule	morphine sulfate * 30 mg	
ACTISKENAN 5 mg Gél B/14	gélule	morphine sulfate * 5 mg	
ACTONEL 30 mg Cpr pell B/28	comprimé pelliculé	risédronate sodique * 30 mg	
ACTONEL 35 mg Cpr pell 3Plq/4	comprimé pelliculé	risédronate sodique * 35 mg	
ACTONEL 5 mg Cpr pell B/28	comprimé pelliculé	risédronate sodique * 5 mg	
ACTRAPID PENFILL 100 UI/ml S inj en cartouche 5Cart/3ml	solution injectable	insuline humaine biogénétique * 300 UI/ml	
ACUPAN 5 inj 5Amp/2ml	solution injectable	néfopam chlorhydrate * 20 mg/2 ml	
ADANCOR 10 mg Cpr séc B/30	comprimé sécable	nicorandil * 10 mg	
ADANCOR 20 mg Cpr B/30	comprimé	nicorandil * 20 mg	
AERIUS 5 mg Cpr pell B/15	comprimé pelliculé	desloratadine * 5 mg	
ALPRESS LP 2,5 mg Cpr osmot LP Plq/30	comprimé osmotique à libé prazosine (chlorhydrate) * 2,5 mg		
ALPRESS LP 5 mg Cpr osmot LP Plq/30	comprimé osmotique à libé prazosine (chlorhydrate) * 5 mg		
AMIKACINE MYLAN 1 g Pdr sol inj 20FI/1g	poudre pour solution inject amikacine (sulfate) * 1 g		
AMIKACINE MYLAN 500 mg Pdr sol inj 20FI	poudre pour solution inject amikacine (sulfate) * 500 mg		
AMLOR 10 mg Gél B/30	gélule	amlodipine (bésilate) * 10 mg	
AMLOR 5 mg Gél B/30	gélule	amlodipine (bésilate) * 5 mg	
AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ZYDUS FRANCE 100 mg/12,5 mg/ml Pdr susp buv en facon enfant FI/14g+ser	poudre pour suspension bu	acide clavulanique (sel de K) * 12,5 mg/ml + amoxicil	
AMOXICILLINE ALMUS 1 g Cpr disp Plq PVC/TE/PVDC/Alu/14	comprimé dispersible	amoxicilline * 1 g	

Accès bibliothèque Médicament sur Hemadialyse

Médicaments																tous les médicaments										Filtre	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	0-9	
Nom														Forme Galénique				DC				Au Livret					
HALDOL 1 mg Cpr B/40														comprimé				halopéridol * 1 mg									
HALDOL 5 mg Cpr B/30														comprimé				halopéridol * 5 mg									
halopéridol * 1 mg ; voie orale ; cp														comprimé				halopéridol * 1 mg ; voie orale ; cp									
halopéridol * 5 mg ; voie orale ; cp														comprimé				halopéridol * 5 mg ; voie orale ; cp									
HEMIGOXINE NATIVELLE 0,125 mg Cpr 2Plq/15 (														comprimé				digoxine * 0,125 mg									
HEMOCLAR 0,5 % Cr T/30g														crème				pentosane polysulfate * 0,5 %									
héparine calcique * 25 000 UI/ml ; voie par														solution injectable				héparine calcique * 25 000 UI/ml ; voie par									
héparine calcique * 25000 UI/ml														solution injectable				héparine calcique * 25000 UI/ml									
HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/ml S														solution injectable				héparine calcique * 25 000 UI/ml									
HEPARINE CALCIQUE PANPHARMA 25 000 UI/ml S														solution injectable				héparine calcique * 25 000 UI/ml									
HEPARINE CHOAY 25 000 UI/5 ml S inj 10Fl/5m														solution injectable				héparine sodique				X					
HEPARINE CHOAY 5000 UI/1 ml S inj 50Amp/1ml														solution injectable				héparine sodique * 5 000 UI/1 ml									
HEPARINE CHOAY 5000 UI/ml S inj IV 20Amp/1m														solution injectable				héparine sodique * 5000 UI/ml				X					
héparine sodique														solution injectable				héparine sodique									
héparine sodique * 5 000 UI/1 ml ; hémodial														solution injectable				héparine sodique * 5 000 UI/1 ml ; hémodial									

Bibliothèque Médicament sur Hemaweb

Chaque fiche contient de très nombreuses informations réparties sur 5 pages :

La page 1 donne les données essentielles, notamment les dénominations, les codes (CIP, UCD), les doses, les modes d'administration :

102048
M05BA04

livret thérapeutique : ☐

0 patients

FICHE Médicament

PAGE 1

PAGE 2

Posologie Vidal

Autres infos

Protocoles

Nom médicament

ACIDE ALENDRONIQUE ALTER 70 mg Cpr pell Plq/12

Appellation internationale

acide alendronique (sel monosodique) * 70 mg

Laboratoire

Alter

Code CIP

3825008

Code UCD

9312126

CIP 13

3400938250084

UCD 13

3400893121269

Prix unitaire

22,66 €

Type de médicament

Type de prescription

Famille du Médicament

Sous Famille

Posologie Standard

Indications

Ostéoporose post-ménopausique avérée, traitement préventif des fractures (de l')

Contre-indications

Allaitement
Altération de l'état buccodentaire
Cancer
Carence en vitamine D
Duodénite
Dysphagie

Précaution d'emploi

Famille Dossier Médical 1

Famille Dossier Médical 2

Famille Dossier Médical 3

Médicament non remboursé à 100 %

☐

Générique

☒

Médicament à contrôle particulier

☐

Médicament soumis à protocole

☐

Médicament non substituable

☐

Médicament anticholinergique

☐

Stupéfiant

☐

Médicament à risque

☐

Dosage(s)

1

Unité(s) de dispensation

comprime

Unité(s) d'administration

3

g

mg

Forme(s) galénique(s)

comprimé pelliculé

Mode(s) d'administration

orale

HR

Fiche Médicament sur Hemadialyse

101413
B03XA02

ARANESP 300 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0.6ml

Nom*: ARANESP 300 µg S inj en seringue préremplie Ser préremplie sécurisée/0.6ml
 Appellation internationale: darbépoutine alfa * 500 µg/ml ; S inj
 Laboratoire: Amgen

Fam. Dos. Médical 1
 Fam. Dos. Médical 2
 Fam. Dos. Médical 3

☒ Livret thérapeutique

☐ Médicament non remboursé à 100%
☐ Médicament non substituable

☐ Médicament générique
☐ Médicament anticholinergique

☒ Médicament à contrôle particulier
☐ Médicament à risque

☐ Médicament soumis à protocole
☐ Stupéfiant

Page 1 | Page 2 | Posologie Vidal | Autres Infos | Protocoles

Code CIP : 3959358
 CIP 13 : 3400939593586
 Prix unitaire : 364.08 €

Code UCD : 9335021
 UCD 13 : 3400893350218
 depuis le 20-10-2015

Famille médicament à contrôle particulier : ARANESP
 Type de médicament : EPO
 Type de prescription : doses variables par séance

Famille du médicament :
 Sous Famille :

Posologie Standard

Indications
 Anémie chez l'insuffisant rénal chronique
 Anémie de l'adulte atteint de tumeur maligne non myéloïde traité par chimiothérapie

Contre-indications
 Allaitement
 Anémie chez le patient cancéreux
 Anémie ferriprive
 Carence en acide folique et en vitamine B12
 Hémodiagénèse

Dosage(s)
 0.6

Unité(s) d'administration
 g
 mcg
 mg

Forme(s) galénique(s)
 solution injectable

Mode(s) admission
 intraveineuse
 sous-cutanée

Unité(s) de dispensation
 ml

Fiche Médicament sur Hemaweb

Les unités de dispensation, les formes galéniques et les modes d'administration doivent être choisies au sein d'une liste fournie par VIDAL. Ces listes ne sont pas modifiables lors de la prescription. Les unités d'administration doivent être choisies au sein d'une liste paramétrable depuis les paramètres « traitements » dont les valeurs possibles sont fournies par VIDAL.

La page 2 permet d'associer le médicament commercialisé par un laboratoire à d'éventuels médicaments génériques et/ou à des médicaments de substitution présents au livret thérapeutique :

0 patients

FICHE Médicament

PAGE 1 | PAGE 2 | Posologie Vidal | Autres infos | Protocoles

Nom médicament: ACIDE ALENDRONIQUE ALTER 70 mg Cpr pell Plq/12
 Appellation internationale: acide alendronique (sel monosodique) * 70 mg
 Laboratoire: Alter

Common Name: acide alendronique (sel monosodique) * 70 mg ; voie orale ; cp
 Common ID: 1752

Nom du médicament virtuel: acide alendronique (sel monosodique) * 70 mg ; cp
 Nom court du médicament: ACIDE ALENDRONIQUE ALTER 70 mg cp pellic
 Prix unitaire (BDM): 22.66 € Depuis le: 00/00/00

Génériques associés

Générique 1:
 Générique 2:

Principe actif
 acide alendronique

Médicament(s) de substitution (au livret)

Famille Dossier Médical 1
 Famille Dossier Médical 2
 Famille Dossier Médical 3

Médicament non remboursé à 100 %
☐ Générique
☒ Médicament à contrôle particulier
☐ Médicament soumis à protocole
☐ Médicament non substituable

Médicament anticholinergique:
☐ Stupéfiant:
☐ Médicament à risque:

Classe ATC
 M05BA04 - ALENDRONIQUE ACIDE
 M05BA - BISPHOSPHONATES
 M05B - MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LA STRUCTURE OSSEUSE ET SUR LA MINÉRALISATION
 M05 - MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES DÉSORDRES OSSEUX
 M - MUSCLE ET SQUELETTE

Fiche Médicament page2 sur Hemadialyse

102168
N02BE01

DOLIPRANE 100 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach

Nom* : DOLIPRANE 100 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach Fam. Dos. Médical 1
 Appellation internationale : paracétamol * 100 mg Fam. Dos. Médical 2
 Laboratoire : Sanofi-Aventis France Fam. Dos. Médical 3

☐ Livret thérapeutique
☐ Médicament non remboursé à 100%
☐ Médicament non substituable
 ☐ Médicament générique
☐ Médicament anticholinergique
 ☐ Médicament à contrôle particulier
☐ Médicament à risque
 ☐ Médicament soumis à protocole
☐ Stupéfiant

Page 1 **Page 2** Posologie Vidal Autres Infos Protocoles

Common Name : paracétamol * 100 mg ; voie orale ; pdre p sol buv sach
 Common ID : 1859
 Nom du médicament virtuel : paracétamol * 100 mg ; pdre p sol buv sach
 Nom court du médicament : DOLIPRANE 100 mg pdre p sol buv en sachet-dose
 Prix unitaire (BDM) : 1 € depuis le

Principe Actif

Nb unités	Quantité	Unité
1	100	mg

Médicament(s) de substitution (0)

Classe ATC

N02BE01 - PARACETAMOL
 N02BE - ANILIDES
 N02B - AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES
 N02 - ANALGESIQUES
 N - SYSTEME NERVEUX

Enregistrer les modifications Supprimer Retour

Fiche Médicament page2 sur Hemaweb

La page « Posologie VIDAL » permet d'afficher la posologie AMM et la composition chimique du médicament telles qu'importées de la base médicamenteuse VIDAL :

FICHE Médicament

PAGE 1 **PAGE 2** Posologie Vidal Autres infos Protocoles

Nom médicament : ACIDE ALENDRONIQUE ALTER 70 mg Cpr pell Plq/12
 Appellation internationale : acide alendronique (sel monosodique) * 70 mg
 Laboratoire : Alter

Posologie AMM

Posologie
 La posologie recommandée est d'un comprimé pelliculé à 70 mg d'ACIDE ALENDRONIQUE ALTER une fois par semaine par voie orale.
 La durée optimale du traitement de l'ostéoporose par les bisphosphonates n'a pas été établie. La nécessité de poursuivre le traitement doit être réévaluée périodiquement en fonction des bénéfices et des risques qu'implique la prise du comprimé ACIDE ALENDRONIQUE ALTER au cas par cas, en particulier après 5 ans ou plus d'utilisation.
 Afin de permettre une absorption suffisante de l'alendronate :
 * ACIDE ALENDRONIQUE ALTER doit être pris l'estomac vide, au moins 30 minutes avant la première prise d'aliments, de boissons ou de médicaments de la journée et

Composition Chimique

acide alendronique sel monosodique trihydrate (principe actif)
 cellulose microcristalline (excipient)
 silice colloïdale anhydre (excipient)
 croscarmellose sel de Na (excipient)
 magnésium stéarate (excipient)
 lustre clear LC 103 (excipient)

Famille Dossier Médical 1
 Famille Dossier Médical 2
 Famille Dossier Médical 3

☐ Médicament non remboursé à 100 %
☒ Générique
☐ Médicament à contrôle particulier
☐ Médicament soumis à protocole
☐ Médicament non substituable
☐ Médicament anticholinergique
☐ Stupéfiant
☐ Médicament à risque
☐ Médicament hors AMM
☐ Médicament invisible
☐ Médicament virtuel

Code CIS (ANSM)
 69784280

Fiche Médicament « Posologie Vidal » sur Hemadialyse

Nom* : DOLIPRANE 100 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach Fam. Dos. Médical 1
 Appellation internationale : paracétamol * 100 mg Fam. Dos. Médical 2
 Laboratoire : Sanofi-Aventis France Fam. Dos. Médical 3

☐ Livret thérapeutique
☐ Médicament non remboursé à 100%
☐ Médicament non substituable
 ☐ Médicament générique
☐ Médicament anticholinergique
 ☐ Médicament à contrôle particulier
☐ Médicament à risque
 ☐ Médicament soumis à protocole
☐ Stupéfiant

Page 1 Page 2 **Posologie Vidal** Autres Infos Protocoles

☐ Médicament hors AMM
☐ Médicament invisible
☐ Médicament Virtuel

Code CIS (ANSM) : 64793681

Posologie Vidal

POSOLOGIE :
 Cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 20 kg (soit environ de 3 mois à 7 ans).
 Chez l'enfant, il est impératif de respecter les posologies définies en fonction du poids de l'enfant et donc de choisir une présentation adaptée. Les âges approximatifs en fonction du poids sont donnés à titre d'information.
 La dose quotidienne de paracétamol recommandée est d'environ 60 mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.
 Cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 20kg (environ 3 mois à 7 ans)
 - Pour les enfants ayant un poids de 6 à 8 kg (environ 3 à 9 mois), la posologie est de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 sachets par jour.
 - Pour les enfants ayant un poids de 9 à 10 kg (environ 9 à 18 mois), la posologie est de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 sachets par jour.
 - Pour les enfants ayant un poids de 11 à 16 kg (environ 18 mois à 5 ans), la posologie est de 2 sachets par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 8 sachets par jour.
 - Pour les enfants ayant un poids de 17 à 20 kg (environ 4 à 7 ans), la posologie est de 2 sachets par prise, à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 12 sachets par jour.
 -- Doses maximales recommandées : cf. Mises en garde et Précautions d'emploi.
 -- Fréquence d'administration :

Composition Chimique

paracétamol : 100 mg (principe actif)
 sodium benzoate (excipient)
 povidone K 30 (excipient)
 monoglycérides diacétyles (excipient)
 titane dioxyde (excipient)
 orange arôme (excipient)
 eau (excipient)
 maltodextrine (excipient)
 glucose (excipient actif)
 gomme arabique (excipient)
 orange essence (excipient)
 saccharose (excipient actif)

Fiche Médicament « Posologie Vidal » sur Hemaweb

La page « Autres infos » permet de saisir d'autres informations issues d'autres sources, notamment des identifiants externes :

FICHE Médicament

PAGE 1 | PAGE 2 | Posologie Vidal | **Autres infos** | Protocoles

Nom médicament : ACIDE ALENDRONIQUE ALTER 70 mg Cpr pell Plq/12

Appellation internationale : acide alendronique (sel monosodique) * 70 mg

Laboratoire : Alter

ID Product : 84647

ID externe 1 et 2 :

Type médicament :

Code ACL : ACL 13 :

Posologie Non VIDAL :

Complément posologie :

Famille Dossier Médical 1 :

Famille Dossier Médical 2 :

Famille Dossier Médical 3 :

Médicament non remboursé à 100 % : ☐

Générique : ☒

Médicament à contrôle particulier : ☐

Médicament soumis à protocole : ☐

Médicament non substituable : ☐

Médicament anticholinergique : ☐

Stupéfiant : ☐

Médicament à risque : ☐

Page 1 1/1 Ligne 1, Col 1

Fiche Médicament « Autres Infos » sur Hemadialyse

102168
N02BE01

DOLIPRANE 100 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach

Nom* : DOLIPRANE 100 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach

Appellation internationale : paracétamol * 100 mg

Laboratoire : Sanofi-Aventis France

Fam. Dos. Médical 1 :

Fam. Dos. Médical 2 :

Fam. Dos. Médical 3 :

☐ Livret thérapeutique

☐ Médicament non remboursé à 100%

☐ Médicament non substituable

☐ Médicament générique

☐ Médicament anticholinergique

☐ Médicament à contrôle particulier

☐ Médicament à risque

☐ Médicament soumis à protocole

☐ Stupéfiant

Page 1 | Page 2 | Posologie Vidal | **Autres Infos** | Protocoles

ID BDM : 5485

ID externe 1 & 2 :

Type de médicament : VIDAL

Code ACL : ACL 13 :

Posologie Non Vidal :

Enregistrer les modifications | Supprimer | Retour

Fiche Médicament « Autre Infos » sur Hemaweb

La page « Protocoles » permet d'associer des documents correspondant à un protocole de préparation ou d'administration pour le médicament :

FICHE Médicament

Famille Dossier Médical 1
 Famille Dossier Médical 2
 Famille Dossier Médical 3

PAGE 1 | PAGE 2 | Posologie Vidal | Autres infos | Protocoles

Nom médicament : ACIDE ALENDRONIQUE ALTER 70 mg Cpr pell Plq/12
 Appellation internationale : acide alendronique (sel monosodique) * 70 mg
 Laboratoire : Alter

☐ Médicament non remboursé à 100 %
☒ Générique
☐ Médicament à contrôle particulier
☐ Médicament soumis à protocole :
☐ Médicament non substituable :
☐ Médicament anticholinergique :
☐ Stupéfiant :
☐ Médicament à risque :

Protocole(s) de préparation :

Protocole(s) d'administration :

Fiche Médicament « Protocole » sur Hemadialyse

Nom* : DOLIPRANE 100 mg Pdr sol buv en sachet-dose 12Sach
 Appellation internationale : paracétamol * 100 mg
 Laboratoire : Sanofi-Aventis France

Fam. Dos. Médical 1
 Fam. Dos. Médical 2
 Fam. Dos. Médical 3

☐ Livret thérapeutique
☐ Médicament non remboursé à 100%
☐ Médicament non substituable
☐ Médicament générique
☐ Médicament anticholinergique
☐ Médicament à contrôle particulier
☐ Médicament à risque
☐ Médicament soumis à protocole
☐ Stupéfiant

Page 1 | Page 2 | Posologie Vidal | Autres Infos | Protocoles

Protocole(s) de préparation
 Choisir un fichier : Aucun fichier choisi
 Ajouter un fichier

Protocole(s) d'administration
 Choisir un fichier : Aucun fichier choisi
 Ajouter un fichier

Enregistrer les modifications | Supprimer | Retour

Fiche Médicament « Protocoles » sur Hemaweb

Ces documents sont stockés sur disque en tant que pièce jointe associée à la fiche de ce médicament et peuvent être consultées lors de la saisie d'une prescription par le médecin lors de l'utilisation de ce médicament en séance.

Parmi les paramètres présents sur toutes les pages de la fiche « médicament », on retrouve :

- Le nom commercial du médicament et son appellation internationale (sa dénomination commune), renseignés par VIDAL et non modifiables par l'utilisateur.
- Les code CIP et UCD permettant d'identifier le médicament en tant que spécialité, renseignés par VIDAL.
- L'option « médicament à contrôle particulier » et le type de médicament permettant de suivre les produits de type « Epo », « Fer » ou « Héparine » (à renseigner manuellement).
- Le fait que le médicament est classé comme « stupéfiant » (information fournie par VIDAL).

Il y a aussi dans la partie droite de chaque page des caractéristiques éditables uniquement par l'utilisateur habilité (VIDAL ne fournit pas ces informations) :

- Le fait que le médicament soit soumis à protocole. Si cette option est cochée, le texte décrivant protocole d'administration s'affiche sous la liste des documents relatifs aux protocoles d'administration et le texte saisi dans ce champ est proposé lors de la saisie d'un traitement en séance pour ce médicament soumis alors à protocole.
- Le caractère « anticholinergique », « stupéfiant » et/ou « à risque du médicament, pour pouvoir le signaler à bon escient au prescripteur.
- Le fait que le médicament soit pris en charge ou non dans l'ALD.

- Le fait que l'ANSM considère le médicament comme « à risque ».
- Le fait que le médicament soit par défaut non substituable pour toute prescription.


3.2. Editer le dossier patient

Pour ce qui est de l'édition du dossier patient général, vous êtes priés de vous référer au document dédié DT35-HMD-dossier_medical_V4 pour Hemadialyse.

Cette partie s'intéresse principalement à la configuration du dossier patient pour les fonctions associées à la prescription sécurisée via VIDAL.

3.2.1. Saisir des allergies

Dans le dossier du patient, allez à l'onglet « Médical ».



Mr CALE MEHDI (2112) né le 01/02/1943

2112
Hémodialyse

[1]

Identité | Administratif | Médical | Prescription Dialyse | Plasmaphérèse | Diabète | Voie d'abord | Propriétés | Transplantation | Comorbidités | Infos FPC MRC | FPC MRC | Télésurveillance | DMP

Divers

Groupe Sanguin : (1) 00/00/00

Groupe Sanguin : (2) 00/00/00

TA habituelle couché : 147/083 mmHg

TA habituelle debout : mmHg

Diurèse résiduelle : 0 ml/24h

Patient anurique : non renseigné

Créatinine de référence : 0 umol/l

R.A.I. : 00/00/00

dernière transfusion : 31/10/2019

I.C.T. : 0 Depuis le : 00/00/00

Dernier KTV : 0

DFG : mL/min/1.73m2 Depuis le : 00/00/00

Stade IRC : non renseigné

inclus dans forfait "FPC-MRC" : ☐

Néphropathie initiale

Mesures

Taille : 165 cm

Prise poids hab : 0 kg

BMI : 0

Périmètre ombilical : 0 cm

Sérologie

VHC Hbs Ac

PCR Hbs Ag

PCR HBV H.L.V.

Hbc Ac

Diabète

non renseigné patient insulino-requérant

Type de diabète :

Allergies

☐ aucune allergie connue

Informations particulières liées aux allergies

Message feuille de dialyse

Pansement(s)

HR

Si aucune allergie n'a été décelée pour le patient, il est important de cocher la case « aucune allergie connue ».

Sélectionnez l'icône  au-dessus du champ allergie pour ouvrir la fenêtre d'ajout d'allergies.

Mr CALE MEHDI (2112) né le 01/02/1943
AJOUT D'ALLERGIE

Recherche par spécialité 
 ou Recherche dans la BDM 
 Classe(s)
 Molécule(s)
 Saisie libre

Annuler Ajouter

Sur cette fenêtre, vous avez deux options :

- Ajouter une allergie depuis la liste des allergies / molécules allergènes répertoriées dans la base VIDAL
 - Dans ce cas, vous pouvez rechercher un médicament contenant cette molécule cet outil
 - Ou via le nom de l'allergie / de la molécule
- Ajouter une allergie via un texte libre.



Attention ! Les allergies rentrées en texte libre ne peuvent être interprétées par VIDAL et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des interactions médicamenteuses.

Le patient peut avoir plusieurs allergies répertoriées, pour une ou plusieurs classes d'allergie ou pour telle ou telle molécule.

L'ajout d'une allergie déclenche la vérification par VIDAL d'éventuelles contre-indications allergiques selon ses traitements médicamenteux courants. Cette vérification peut à tout moment être demandée par l'utilisateur par un simple clic sur cette icône . (Hemodialyse uniquement)

3.2.2. Saisir des pathologies/comorbidités associées pour le calcul VIDAL

Pour prendre en compte les éventuelles pathologies associées du patient, il est nécessaire d'ajouter le diagnostic de celles-ci à la fiche PMSI du patient.

Cela peut être fait de 3 manières différentes.

3.2.2.1. Ajout via le dossier patient (Hemodialyse uniquement)

Vous pouvez renseigner les pathologies depuis le même onglet que pour renseigner les allergies du patient.

Mr CALE MEHDI (2112) né le 01/02/1943

2112 Hémodialyse

Identité | Administratif | Médical | Prescription Dialyse | Plasmaphérèse | Diabète | Voie d'abord | Propriétés | Transplantation | Comorbidités | Infos FPC MRC | FPC MRC | Télésurveillance | DMP

Divers

Groupe Sanguin : (1) 00/00/00 
 Groupe Sanguin : (2) 00/00/00 
 TA habituelle couché : 147/083 mmHg
 TA habituelle debout : mmHg
 Diurèse résiduelle : 0 ml/24h
 Patient anurique : non renseigné 
 Créatinine de référence : 0 umol/l

R.A.I. : 00/00/00 
 dernière transfusion : 31/10/2019 
 I.C.T. : 0 Depuis le : 00/00/00 
 Dernier KTV : 0 
 DFG : mL/min/1.73m² Depuis le : 00/00/00 
 Stade IRC : non renseigné 

Néphropathie initiale 

Mesures

Taille : 165 cm  Prise poids hab : 0 kg 
 BMI : 0  Périmètre ombilical : 0 cm 

Sérologie

VHC  Hbs Ac 
 PCR  Hbs Ag 
 PCR HBV  H.L.V. 
 Hbc Ac 

Diabète

non renseigné  patient insulino-requérant ☐
 Type de diabète :

Allergies

☐ aucune allergie connue  

Informations particulières liées aux allergies 

Message feuille de dialyse 

Pansement(s) 

HR

Cliquez sur « Néphropathie initiale » pour ouvrir la fenêtre de recherche des pathologies associées :

Néphropathie initiale

☒ CIM 10
 ☐ EDTA
 ☐ CCAM
 ☐ Thesaurus

Code	Libellé
	TEST
184	Maladie rénale chronique ,stade 4
A00	Choléra
A00.0	Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1	Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar El Tor
A00.9	Choléra, sans précision
A01	Fièvres typhoïde et paratyphoïde
A01.0	Fièvre typhoïde
A01.1	Paratyphoïde A
A01.2	Paratyphoïde B
A01.3	Paratyphoïde C
A01.4	Paratyphoïde, sans précision
A02	Autres salmonelloses
A02.0	Entérite à Salmonella
A02.1	sepsis à Salmonella
A02.2	Infection localisée à Salmonella
A02.8	Autres infections précisées à Salmonella
A02.9	Salmonellose, sans précision

17985

Rechercher par libellé

Rechercher par code

Rechercher par code spécifique

HR

Vous pouvez ici rechercher des diagnostics de plusieurs manière :

- ☐ Par le code CIM10
- ☐ Par le code EDTA
- ☐ Par le code CCAM
- ☐ Par le code Thesaurus

Vous avez aussi 3 conditions de recherche possible : par code, par code spécifique et par libellé.

Quelle que soit le diagnostic que vous choisissiez, Hemadialyse vous demandera de valider l'ajout à la fiche PMSI avant la validation.

Si vous refusez, le diagnostic sera saisi dans le dossier patient mais ne sera pas envoyé au PMSI et ne pourra donc pas être pris en compte par VIDAL.



De la même manière que pour les allergies, vous pouvez saisir dans le champ « Néphropathie » du texte libre, mais VIDAL ne prendra en compte les pathologies associées uniquement si elles sont ajoutées à la fiche PMSI de ce patient.

3.2.2.2. Ajout via les consultations médicales (Hemadialyse uniquement)

Une fois le patient sélectionné, cliquez sur cette icône dans le « QuickMenu » à droite :



Hemadialyse


Une fois dans la liste des dernières consultations, ajoutez une nouvelle consultation avec l'icône .

Dans ce nouveau menu, cliquez sur ce bouton  pour accéder à la recherche de diagnostic VIDAL.

Une fois le diagnostic ajouté, renseignez le reste des informations nécessaires et validez la consultation

avec .


Après avoir validé la consultation, elle apparaît dans la liste du dossier médical :



Ouvrez la consultation récemment créée. Dans la barre supérieure, cliquez sur ce bouton pour ajouter le diagnostic au PMSI, et ainsi ajouter la pathologie à son dossier pour pouvoir la prendre en compte dans le check VIDAL.


3.2.2.3. Ajout via la fiche PMSI (Hemadialyse & Hemaweb)

Ouvrir la fiche PMSI du patient depuis le menu QuickView :




Hemadialyse | Hemaweb

Une fois dans la fiche, ajoutez un nouveau diagnostic :



Hemadialyse



Hemaweb

3.3. Paramétrage général

Le paramétrage du module de prescription se fait depuis Hemadialyse (Hemaweb ne propose que quelques options facultatives, le paramétrage global ne peut être effectué que sur la base 4D).

Cette partie est destinée aux utilisateurs confirmés, ayant des droits d'accès administrateurs pour modifier les profils d'utilisateurs et le paramétrage d'Hemadialyse.

Il existe un certain nombre de paramètres éditables pour gérer la prescription selon votre méthode de travail.


Cette partie vous présente uniquement le paramétrage relatif à la prescription, depuis les profils médecins ainsi que dans le paramétrage général. Veuillez consulter le document *DT13_Manuel Paramétrage HMDV04* en annexe si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans cette partie.

Important : Certains paramètres peuvent être contradictoires : c'est notamment le cas lorsqu'on modifie des préférences de profils médecins ou établissements par exemple.

Dans ce cas, une logique de PRIORITE permet de définir quel paramétrage est effectif en cas de contradiction (exemple : options d'affichage des ordonnances spécifiques à un médecin vs paramètres par défaut).

Lorsque de telles règles de priorité ont lieu, cela sera spécifié dans le manuel.

Pour accéder à ces pages, suivez cette méthode :






Si ces options ne s'affichent pas lors du clic sur l'icône , vous n'êtes pas connecté sur un compte ayant les droits suffisants pour accéder au paramétrage. Veuillez consulter le responsable Hemadialyse de votre service pour transmettre votre demande.

Depuis l'écran de paramétrage, cliquer ici :

Paramétrage



Note : Vous pouvez avoir des icônes différentes depuis ce menu en fonction des modules activés pour votre base. L'icône  devrait toujours être disponible.

Vous arrivez ainsi sur la page de paramétrage des traitements :


✓

Traitements Traitements (2) Traitements en séance soumis à restriction Antibiotiques / Réévaluations médicamenteuses Ordonnances Pharmacie / Vaccination Photos Traitements

Traitements

(a) Interdire une durée de prescription supérieure à un an : ☒ En séance : ☒ Hors séance : ☒

(b) Délai pour une fin prochaine d'un traitement : Jour(s)

(c) Signaler dans le navigateur la fin proche ou atteinte d'au moins un des traitements actifs d'un patient (fond de couleur de l'icône "traitements") : ☒

(d) Recherche de la dernière date d'administration lors d'une prescription : ☐

(e) Rechercher par défaut dans le livret : ☒

(f) Afficher la substitution ou le remplacement en prescription : ☒

(g) Proposer la substitution ou le remplacement en prescription : ☒

(h) Proposer la liste des spécialités pressenties lors d'une prescription en DC : ☒

(i) Cocher par défaut l'ajout ponctuel d'un traitement en séance comme prescrit en urgence : ☒

(j) Générer une éphéméride en cas de prescription en urgence : ☒

(k) Générer une éphéméride en cas d'arrêt en urgence d'une prescription : ☒

(l) Générer une éphéméride en cas de prescription probabiliste : ☐

(m) Afficher une alerte dans la barre Windows en cas de substitution ou de remplacement : ☐

Substitution proposée en prescription selon la classe ATC à partir des : premier(s) caractère(s)

(n) Arrêt automatique des traitements avec date de fin dépassée : ☐

(o) Arrêt automatique des traitements paramétrés pour un arrêt en date de fin de prescription : ☐

(p) Liste par défaut des unités de dispensation (hors UCD) :

(q) Alerte si mouvement planning patient : ☒

HR

Important : Les lignes *grisées* sont des anciennes options considérées OBSOLETE pour la version en cours. Elles restent accessibles pour des raisons de compatibilité mais elles n'ont aucun impact et à ce titre, ces paramètres ne sont pas décrits dans le présent manuel.

Vous avez ainsi plusieurs options à disposition, répartis dans les onglets suivants :

3.3.1. Traitements

Depuis cet onglet, les options paramétrables ont l'effet suivant : (de haut en bas)

- a) Interdire ou non la prescription supérieure à un an : activé, il sera impossible pour le médecin de prescrire un traitement pour une durée supérieure à un an. Option activable pour les traitements hors séance (ville) ou en séance séparément
- b) Délai pour la date de fin : Indique quand indiquer « Traitement en date de fin proche » pour un traitement dans la liste des traitements en cours (par défaut : 10 jours avant la date de fin)
- c) Activer ou non le changement de couleur de l'icône  dans le menu Quickview d'un patient si l'un de ces traitements est proche de sa date de fin
- d) Rechercher automatiquement la dernière administration d'un médicament à un patient quand celui-ci est prescrit de nouveau ("ajout" en séance).
- e) Activer ou non la recherche par défaut au livret lors de la recherche d'un médicament lors de l'ajout d'une prescription
- f) Activer un message pop-up lors de la sélection d'un traitement ayant été paramétré comme substituable dans sa fiche
- g) Activer l'affichage d'un bouton en bas de page permettant de substituer ou remplacer un traitement (si paramétré dans la fiche médicament) lors de l'ajout d'un traitement.
 - o Substitution manuelle : La substitution se fait selon les règles de la pharmacie
 - o Substitution selon le médicament virtuel : Autorise la substitution d'un médicament virtuel par une spécialité au livret de la même molécule

Important : Les règles de substitution ou de remplacement du médicament fixées dans la fiche "établissement" ont la priorité sur ces paramètres généraux. (Onglet « Paramétrage (suite) » > Traitements)

- h) Afficher un bouton lors de la prescription d'une DC/DCI permettant de voir les spécialités associées à cette DC dans le livret
- i) Activer ou non le statut « prescrit en urgence » par défaut lors de l'ajout d'un traitement ponctuel depuis une feuille de séance
- j) Activer la génération automatique d'une éphéméride dès qu'un médicament est prescrit en urgence
- k) Activer la génération automatique d'une éphéméride dès qu'un médicament est arrêté en urgence

Note : Vous pouvez définir un éphéméride type pour les éphémérides de prescription/arrêt en urgence)

- l) Activer la génération automatique d'une éphéméride dès qu'un médicament est prescrit avec l'option « prescription probabiliste »
- m) Générer une alerte Windows lors de la substitution / remplacement d'un traitement
- n) Arrêter automatiquement TOUS les traitements ayant atteint leur date de fin
- o) Arrêter automatiquement les traitements ayant atteint leur date de fin si cela a été paramétré lors de la prescription
- p) Ce champ permet d'éditer la liste des unités de dispensations par défauts proposé lorsqu'on veut modifier la méthode de dispensation d'un traitement (prescription hors UCD)

- q) Générer une alerte pop-up lors de la modification du planning de prescription d'un patient dans le dossier patient (ex : on change un patient ayant ses séances prescrites le Lun Mer Ven => Mar Jeu Sam)
 Cette alerte demande à l'utilisateur de vérifier la cohérence de la prescription et de la modifier en fonction



Lors de la prescription d'un traitement en séance d'un patient « Tous les jours de dialyse » ou « Certains jours de dialyse », la prescription se fait selon les jours de dialyse prescrit au jour de l'ajout du traitement (ex : Traitement X prescrit « tous les jours de dialyse » =

Traitement X prescrit le Lun, Mer, Ven)

Lors de la modification du planning des séances d'un patient, la posologie des traitements N'EST PAS automatiquement mise à jour, et il est nécessaire de refaire la prescription du patient pour les nouveaux jours de dialyse.

3.3.2. Traitements (2)

Traitements (2)

- (a) Inclure les traitements non arrêtés à date de fin dépassée dans les traitements actifs lors des éditions via une variable système (compatibilité version 3) ☐
- (b) Hauteur optimisée des lignes dans les listes des traitements d'un patient ☒
- (c) Affichage plus grand de la posologie dans les listes des traitements d'un patient ☒
- (d) Affichage de la DC dans la posologie des traitements actifs d'un patient ☒
- (e) Affichage de toutes les dates de prochaine délivrance pas seulement les dix prochaines ☒
- (f) Demande si patient informé en cas de modification de sa prescription courante ☐
- (g) Activer la prescription a priori : ☒
- (h) Activer le bouton "arrêter TOUS les traitements" : ☒
- Mise à jour automatique de la posologie en modification de traitement ☐
- Alerte en modification de traitement ☒
- fiche médicament détaillée ☒
- Mise à jour automatique de la posologie réduite ☒
- Construction Posologie détaillée : ☒
- Option "compteur administration" des traitements en séance ☐

Informations médicales

Lien IPAQSS - HAS : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1219705/fr

- a) Cette option n'est utile que si certains de vos patients possède des traitements ayant été prescrits avec la V3 d'Hemadialyse. Dans le doute, si votre établissement était précédemment équipé de cette version, cocher ce paramétrage
- b) Cette option permet d'adapter la hauteur des lignes des traitements en fonction de la taille des posologies des traitements prescrits afin de garder le même rapport de taille à chaque ligne
- c) Cette option permet d'allouer plus de place à l'affichage de la posologie des lignes de traitement

Note : Par défaut, ces deux options sont cochées. Les captures d'écran du présent manuel correspondent au paramétrage par défaut.

- d) Afficher sur une autre ligne la DC des spécialités prescrites dans chaque ligne de prescription
- e) Activer ou non le calcul de toutes les prochaines dates de délivrances d'un traitement sur le calendrier au lieu de seulement les 10 prochaines dans la page d'ajout de nouveau traitements (peut affecter le temps de calcul)

- f) Générer ou non un message pop-up lors de l'ajout d'une prescription pour demander si le patient a été mis au courant
- g) Prescription à priori = permettre l'ajout d'un traitement avec une autre date de début que la date du jour.
- h) Activer ou non le bouton « Arrêter tous les traitements » dans la liste des traitements en cours du patient ( ou )

3.3.3. Traitement en séance soumis à restriction

Liste des classes ATC soumises à restriction en séance

B03XA02
N02BE01

Ici, vous pouvez éditer la liste des classes ATC soumises à restriction :

Lorsque le paramètre « Ajouter un traitement en séance soumis à restriction » est cochée pour un profil (Paramètres « Accès » > « Fonctions » après avoir sélectionné un niveau de profil), l'utilisateur ne pourra ajouter un traitement en séance que si celui-ci fait partie des classes ATC listées dans ce menu.

3.3.4. Antibiotiques / réévaluations médicamenteuse

(a) Générer une éphéméride en cas de prescription à réévaluer ☒

(b) Liste des classes ATC à réévaluer

D06AX01
J01

Médicament prescrit pour moins de 7 jours à réévaluer

Générer une éphéméride à 48h ☒

Générer une éphéméride à 72h ☐

Générer une éphéméride à 96h ☐

(c)

Médicament prescrit pour 7 jours ou plus à réévaluer

Générer une éphéméride à 48h ☒

Générer une éphéméride à 72h ☐

Générer une éphéméride à 96h ☒

Générer une éphéméride à 7 jours (168h) ☐

(d) Générer une éphéméride en cas de prescription probabiliste ☐

(e) Proposer la création d'une fiche "infection" lors de la prescription d'un antibiotique (classe ATC J01) ☒

(f) Clôturer une infection associée à un traitement quand celui-ci s'arrête ☒

(g) Générer une éphéméride pour cette clôture ☐

(h) Mettre à jour une infection associée à un traitement quand celui-ci est réévalué ☒

(i) Obliger un prescripteur à gérer une réévaluation ☒

La réévaluation médicamenteuse est une option de prescription qui permet de demander obligatoirement la réévaluation d'un traitement à intervalle régulier. Ce mode de prescription est utilisé pour (mais pas seulement) la prescription d'antibiotique en accord avec les critères du CAQES. Lorsqu'un médicament est défini comme devant être réévalué, des éphémérides régulières sont envoyées pour ce patient aux médecins se connectant sur leur profil pour demander d'arrêter ou de prolonger le traitement. Les critères de réévaluations sont paramétrés dans cette page : (de haut en bas)

- a) Générer ou non une éphéméride lors de la prescription de médicament paramétrés avec la réévaluation médicamenteuse (OBLIGATOIRE pour utiliser la réévaluation médicamenteuse)
- b) Vous pouvez utiliser ce champ pour spécifier quelles classes ATC de médicament demandent une réévaluation médicamenteuse régulière (cas des antibiotiques notamment)
- c) Les deux champs suivants permettent de configurer la fréquence d'envoi régulier d'éphéméride de réévaluation médicamenteuse pour les traitements selon s'ils sont prescrit pour 1 semaine ou plus.
- d) Activer ou non l'envoi d'éphéméride lors d'une prescription probabiliste
- e) Activer ou non un message pop-up pour ajouter automatiquement une fiche infection liée à la prescription d'un médicament si celui-ci est un antibiotique (classe ATC J01)
- f) Clôturer ou non une fiche infection liée à un traitement antibiotique lorsque celui-ci est arrêté depuis la page des traitements
- g) Générer ou non une éphéméride lors de la clôture d'une fiche infection
- h) Mettre à jour ou non une fiche infection liée à un traitement lors de la réévaluation
- i) Obliger ou non la prise de décision du médecin pour fermer l'éphéméride (Il est préconisé d'activer ce paramétrage pour utiliser la réévaluation médicamenteuse telle que conçu par EMA.)

3.3.5. Ordonnances

Ordonnances

(a) Activer le contrôle des médicaments courants à la validation d'une ordonnance ☐ Saisie libre du texte des ordonnances ☐

(b) Ordre de tri des traitements

(c) Ajouter la DC aux formes pharmaceutiques à l'édition d'une ordonnance ☒

(d) Ajouter le motif des prescriptions à l'édition d'une ordonnance ☒

(e) Numéroté les lignes d'une ordonnance à l'édition en mode "100% CERFA" ☒

(f) Placer la posologie d'un traitement sur une seconde ligne sur une ordonnance à l'édition en mode "100% CERFA" ☐

(g) Laisser en saisie manuelle l'info "non substituable" à l'édition en mode "100% CERFA" ☐

(h) Préciser le type de médicament "non substituable" à l'édition en mode "100% CERFA" ☒

(i) Ajouter systématiquement un médicament ajouté depuis une ordonnance à la prescription courante du patient concerné ☒

(j) Utiliser le nom court du médicament à l'édition en mode "100% CERFA" ☐

(k) Ajouter la date de fin dans chaque ligne de prescription en mode "100% CERFA" ☐

(l) Insérer un carré sécurisé en bas de l'ordonnance en mode "100% CERFA" ☐

(m) Insérer une ligne blanche entre chaque médicament en mode "100% CERFA" ☐

(n) Ecrire en lettres tous les chiffres présents dans la posologie des stupéfiants ☐

(o) Autoriser le renouvellement d'une ordonnance par un autre prescripteur ☒

(p) Proposer l'envoi d'un message dans les éphémérides du patient en cas de renouvellement(s) demandé(s) ☒

Nombre de médicaments par page
ordonnance en mode "100% CERFA"

Ordonnance en spécialité

Ordonnance sans DC ni motif	16
Ordonnance avec DC avec motif	16
Ordonnance avec DC sans motif	16
Ordonnance avec motif	16

(q)

Ordonnance en DC

	16
--	----

Remarque : Les paramétrages de la fiche médecin ont la **PRIORITE** sur les paramétrages par défauts définis ici. En l'absence de préférence médecin, ce sont ces paramètres qui s'appliquent :

- a) Lancer un check VIDAL avant la validation de toute ordonnance
- b) Ce champ permet de définir l'ordre de tri des traitements sur l'ordonnance
- c) Ajouter la DC aux spécialités sur une autre ligne pour chaque traitement
- d) Ajouter le "motif" de prescription sur une autre ligne pour chaque traitement
- e) Numéroté les lignes par spécialité.
- f) Placer la posologie du traitement sous le nom du médicament sur une autre ligne

- g) Si coché, l'info "non substituable" ne sera pas reprise sur l'ordonnance ; il sera demandé au médecin d'écrire à la main la mention « non substituable » pour chaque ligne concernée.
- h) Si coché, pour chaque traitements « non substituable », le motif de non substitution apparaîtra sur l'ordonnance (MTE, EFG ou CIF)
- i) Si coché, tout médicament ajouté ponctuellement depuis une ordonnance sera ajouté aux traitements actifs du patient.
- j) Utiliser le nom court : utilisation du nom de présentation de la spécialité sans le boitage au lieu du nom complet de la spécialité (nom court paramétré dans la fiche médicament)
- k) Si coché, la date de fin pour chaque traitement sera affichée à chaque fin de ligne, si la date de fin est renseignée.
- l) Carré sécurisé = Icône imprimée en bas de page avec le nombre de traitements affichés sur la page. L'intérêt de ce « carré sécurisé » est de repérer rapidement
- m) Insérer ou non une ligne blanche entre chaque spécialité dans l'ordonnance
- n) Si coché, les chiffres de la posologie des stupéfiants sont en toutes lettres.
- o) Si coché, on autorise le renouvellement d'une ordonnance par un autre prescripteur.
- p) Si coché, une éphéméride est envoyée lorsqu'un renouvellement d'ordonnance est paramétré
- q) Cette zone permet de paramétrer combien de lignes de traitements sont affichées sur chaque page lors de l'impression d'une ordonnance « 100% CERFA ». Attention ! Il est possible de rentrer des paramètres non compatibles avec le format d'impression, il est nécessaire de bien calibrer le nombre de lignes affichées en fonction des paramètres choisis (si on demande à créer un espace supplémentaire entre chaque ligne, il faut diminuer le nombre de lignes par pages par exemple)

3.3.6. Pharmacie / Vaccination

Pharmacie - Traitements

- (a) Mail si modification de traitement : ☒
- (b) Type de traitements concernés
 - Traitements généraux : ☒
 - Traitements avant : ☒
 - Traitements pendant : ☒
 - Traitements après : ☒
 - EPO ☒
 - HEPARINE ☒
 - FER ☒
 - AUTRES ☒
- (c) B.A.L. Pharmacien :
- (d) Type de Format :
- (e) Mail avec traitements groupés : ☒
- (f) Insertion des données de biologie dans le mail : ☒
- (g) Envoi d'un mail à la pharmacie pour les traitements non administrés : ☒
- (h) Envoi d'un mail au néphrologue du patient pour les traitements non administrés : ☐
- (i) Envoi d'un mail au médecin pour les traitements ponctuels : ☒
- (j) Affichage de la posologie au lieu du nom de présentation : ☐
en dispensation nominative
- (k) Mails des autres destinataires cochés comme lus : ☒
en cas de validation ou de désapprobation depuis un mail

Vaccination

- (l) Proposition de création d'une fiche "vaccination" : ☐
lors de l'administration d'un vaccin en séance
- a) Si coché, la pharmacie reçoit un mail si le traitement est modifié, ajouté, prolongé ou arrêté.
- b) La pharmacie recevra par mail les modifications des types de traitements cochés. (cf DT13)
- c) Définir ici quel utilisateur recevra la boîte les mails Hemadialyse adressés à la pharmacie.
- d) Type de format du mail : par défaut ou via un document type.
- e) Si coché, réception de mail avec les traitements groupés (pour le même patient et le même jour).
- f) Si coché, des données de biologie s'afficheront sur le type de format par défaut.

M03d v1.0	Nom du document	Numéro de version	Date de dernière mise à jour	Page
	Manuel utilisation HMD LAP	1.2	21/04/2021	44/51

- g) Si coché, la pharmacie recevra un mail à chaque traitement non administré en séance.
- h) Si coché, le néphrologue responsable de la séance recevra un mail à chaque traitement non administré en séance.
- i) Si coché, le médecin recevra un mail lors d'un ajout ponctuel en séance et pourra valider cet ajout à partir de sa messagerie (sans aller dans chaque séance pour le valider).
- j) Affichage de la posologie au lieu du nom du médicament dans la dispensation nominative.
- k) Lorsqu'un mail de validation pharmacie est envoyé à plusieurs destinataires, si cette option est cochée, le mail sera noté comme « Lu » pour tous les destinataires si une décision de validation/refus est prise par l'un des destinataires. Une mention de la personne ayant validé est alors ajoutée à la fin du mail.
- l) Si coché, lors de l'administration d'un vaccin en séance, une proposition de création de fiche "vaccination" sera demandée, si oui : une fiche apparaîtra dans l'icône "vaccination" du Quickview patient.

3.3.7. Photos Traitement

Gestion des Photos traitements

(a) Activer la fonction automatique des Photos Traitements : ☒

Eléments déclencheurs (b)

Sur arrivée biologie : ☒
 Sur modification traitements : ☒
 Sur admission planning : ☒

Type de patients concernés (c)

Patients hémodialysés : ☒
 Patients en DP : ☒
 Patients transplantés : ☒

Type de traitements concernés (d)


Traitements généraux : ☒
 Traitements avant : ☒
 Traitements pendant : ☒
 Traitements après : ☒

Archivage des données

(e) Archiver les photos tous les Jour(s)

Cette fonction permet de générer un rapport sous forme de texte reprenant l'ensemble de la prescription courante d'un patient lors du déclenchement de certains événements. Ces rapports sont générés dans une table à part dans la base (*Arch_photo_traits*) et sont consultables

depuis la liste des traitements en cours d'un patient via cette icône :



Liste des photos traitements depuis la page des prescriptions en cours

M03d v1.0	Nom du document	Numéro de version	Date de dernière mise à jour	Page
	Manuel utilisation HMD LAP	1.2	21/04/2021	45/51

Depuis cette page, les paramètres suivants sont accessibles :

- Si coché, la fonction « Photo Traitement » est activée pour tous les établissements.
- Définir ici quelles actions entraînent la génération d'une photo traitement
- Définir ici pour quels « types » de patient générer des photos traitements (à définir dans le dossier pat)
- Définir ici sur quels types de traitements les actions définies en b) généreront une photo traitement
- Archivage des données : fréquence d'archivage des photos traitement en jours.

3.3.8. Paramétrage des options VIDAL®



Cet onglet est accessible via l'icône lorsque la page « Traitement » est sélectionnée dans la page des paramètres.

Configuration Base Vidal

- (a) Adresse du serveur Vidal HOPTIMAL® : 192.168.1.169:8011
- (b) Dernière version en ligne de la BdM VIDAL synchronisée avec Hémadialyse : 2021.2.0 19/01/2021
- (c) Autoriser la mise à jour automatique de la bibliothèque médicamenteuse : ☐ **Synchro Livret Ext.**

Configuration options Vidal Hoptimal Service

- (d) Autoriser le calcul des interactions médicamenteuses : ☒
- (e) Autoriser le calcul des contre-indications : ☒
- (f) Autoriser le calcul des incompatibilités physico-chimiques : ☒
- (g) Autoriser le calcul des contre-indications allergiques : ☒
- (h) Afficher le statut VIDAL dans le cadre "Détails" du navigateur : ☒
- (i) Afficher le contrôle détaillé VIDAL des prescriptions : ☒
avec le statut VIDAL calculé par défaut
- (j) Mode de vérification VIDAL : vérification à chaque traitement + contrôle a priori ▼
- (k) Activer le contrôle de la sécurisation des traitements : ☒
- (l) Activer le contrôle d'outrepassement des doses et des durées : ☒
- (m) Activer la saisie d'un commentaire si modification ou prolongation d'une prescription : ☒
- (n) Afficher une alerte dans la barre Windows à l'ajout d'un médicament : ☒
- (o) Afficher une alerte si VIDAL est inaccessible lors du contrôle de la prescription : ☒
- (p) Afficher une alerte si VIDAL est inaccessible en prescription : ☒
- Ecarter les codes Cim10 suivants du calcul des contre-indications (Diag1;Diag2;etc.): N180;N185

Sélection affinée des formes médicamenteuses

- (r) Ecarter les formes médicamenteuses hospitalières : ☐
- Ecarter les produits de diététique : ☐
- Ecarter les accessoires (pansements, etc.): ☐
- Ecarter les produits de balnéologie : ☐

Configuration de la Base Vidal :

- Ce champ vous confirme quelle est l'adresse de publication des données VIDAL®, vérifier si cette adresse est accessible depuis le poste que vous occupez si vous rencontrez des problèmes
- Ce champ affiche la date à laquelle la dernière synchronisation de la bibliothèque locale des médicaments dans la base Hemadialyse avec les données VIDAL® a eu lieu.
- Autoriser la mise à jour automatique de la bibliothèque locale des médicaments dans la base Hemadialyse avec les données VIDAL® : En cas de doute, NE PAS COCHER.

Configuration des options Vidal Hoptimal Service

- Autoriser le calcul des interactions médicamenteuses par VIDAL®.
- Autoriser le calcul des contre-indications par VIDAL®.
- Autoriser le calcul des incompatibilités physico-chimiques par VIDAL®.
- Autoriser le calcul des contre-indications allergiques par VIDAL®.
- Afficher le statut du dernier check VIDAL® dans la partie "Détails" du navigateur pour le patient sélectionné.

- i) Afficher le contrôle détaillé VIDAL® des prescriptions (check général de tous les traitements du patient), avec statut VIDAL® calculé par défaut (check initial lancé à la sélection d'un nouveau traitement par exemple pour calculer les contre-indications de bas niveau).
- j) Liste déroulante pour choisir le mode de vérification VIDAL® : Correspond à la fréquence de lancement du check VIDAL :
 - a. En fin de saisie de plusieurs traitements
 - b. A chaque ajout/modif de traitements
 - c. A chaque ajout/modif de traitements + Check initial à la sélection
- k) Activer le contrôle de la sécurisation des traitements.
- l) Activer le contrôle d'outre passément des doses et des durées.
- m) Activer la saisie d'un commentaire si modification ou prolongation d'une prescription.
- n) Afficher une alerte dans la barre Windows à l'ajout d'un médicament.
- o) Afficher une alerte si VIDAL® est inaccessible lors du contrôle de la prescription.
- p) Afficher une alerte si VIDAL® est inaccessible en prescription.
- q) Ecarter certains codes CIM10 du calcul des contre-indications.

Sélection affinée des formes médicamenteuses

- r) Ecarter les formes médicamenteuses hospitalières, les produits de diététique, les accessoires et les produits de balnéologie des prescriptions médicamenteuses proposées ou vérifiées par VIDAL®.



Attention !

Se référer au document DT25_HMD_LAP_Annexe_2_parametres_LAPH pour connaître le paramétrage de conformité d'Hemadialyse. Ce paramétrage est le paramétrage recommandé par l'utilisation du LAP. Toute désactivation d'alertes ou exclusion de critères de calculs est à la discrétion de l'établissement et EMA n'est pas responsable d'erreurs due à un paramétrage insuffisant des alertes VIDAL par l'établissement.

M03d v1.0	Nom du document	Numéro de version	Date de dernière mise à jour	Page
	Manuel utilisation HMD LAP	1.2	21/04/2021	47/51

4. Avertissements et précautions d'utilisation

Au sens de la directive 93/42/CEE, le module LAP d'Hemadialyse est considéré comme dispositif médical de classe I.

Conformément à la réglementation européenne encadrant les dispositifs médicaux commercialisés au sein de l'UE, cette partie consigne les risques résiduels de la présente version d'Hemadialyse, ainsi que les précautions d'utilisation au regard des situations dangereuse pouvant en résulter.

Cette liste reprend pour chaque point la marche à suivre pour diminuer au maximum l'apparition de situation dangereuse pouvant résulter d'une mauvaise utilisation ou d'une défaillance logicielle du module d'aide à la prescription.

Hemadialyse est un logiciel d'administration et d'aide à la décision conçu pour être utilisé par les différents services et, dans le cas du LAP, par les médecins et pharmaciens de l'établissement.

A ce titre, il n'existe aucune précaution d'utilisation à prendre en ce qui concerne l'exposition des utilisateurs, dans des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, à des champs magnétiques, à des influences électriques externes, à des décharges électrostatiques, à la pression ou à des variations de pression, à l'accélération, à des sources thermiques d'ignition ou à toute autres source de danger environnemental potentiel lors de l'utilisation du dispositif.



Il est demandé aux utilisateurs d'Hemadialyse et d'Hemaweb de prendre conscience de cette liste pour garantir un usage en toute sécurité du dispositif.

Risque	Conduite à tenir
Importation de médicament depuis la base VIDAL : Données corrompues / incomplètes	Le module LAP n'a pas vocation à, et ne pourra jamais remplacer le circuit de validation pharmaceutique du service de pharmacie. Vous devez en toute circonstance respecter scrupuleusement votre méthodologie de validation pharmaceutique par un ou plusieurs pharmaciens compétents. La pharmacie doit avoir accès à des comptes utilisateurs ayant les droits suffisants pour utiliser correctement le module conformément au présent manuel. Se référer au chapitre sur le paramétrage.
Crash du processus nocturne CAIN : Arrêt des traitements automatique Recalcul des données datées (âge, durée de réévaluation médicamenteuse)	Il est fortement recommandé de mettre en place une vérification systématique du statut des services permanents du serveur Hemadialyse. Cette vérification doit s'inscrire dans le plan de maintenance du logiciel par le service informatique de l'établissement et être effectuée dans le meilleur des cas tous les jours, pour pouvoir rapidement agir en cas de défaillance des processus nocturnes.

Informations essentielles pour le calcul VIDAL	Veuillez vous assurer que les informations médicales de vos patients soient bien renseignées dans le dossier Hemadialyse. Lisez attentivement les messages alertes lors du check VIDAL initial et général, pour être sûr de ne pas oublier d'informations essentielles pour le calcul VIDAL, comme le poids sec du patient.
Alertes VIDAL : • Dépassement de la posologie • Redondance de substance(s) active(s) • Alerte en cas d'impact sur la conduite • Alerte en cas de prescription de médicament dopant • Alerte en cas d'incompatibilité physico-chimique • Alerte dépassement de posologie	Veuillez lire dans son intégralité le présent manuel ainsi que l'annexe 1 pour prendre conscience de la signification des différents sigles et icônes utilisée. Veuillez porter une attention particulière aux messages d'alertes et aux pictogrammes récurrents.

5. FAQ

5.1. J'ai déplacé la séance de dialyse d'un patient au planning et les traitements en séance pour celle-ci ont disparu, alors que la prescription n'a pas changé

Lorsque vous éditer la prescription d'un traitement « En Séance » depuis Hemadialyse ou Hemaweb, la posologie se crée en fonction des jours de dialyse définis dans le dossier patient au moment de la prescription.

Si vous avez prescrit au patient des séances de dialyse le Lundi, Mercredi, Vendredi par exemple, en créant une prescription « Tous les jours de dialyse », vous créez en fait une prescription pour tous les Lundi, Mercredi, Vendredi.

Donc supposant que vous avez déplacé la séance du patient un mardi par exemple, la prescription ne s'affichera pas pour cette séance : il faudra l'ajouter manuellement en tant que traitement ponctuel en séance.

Ce fonctionnement est voulu, car EMA ne souhaite pas permettre la création de prescription dynamique. Il s'agit d'un fonctionnement sécurisé, pensé pour permettre de garantir la véracité et l'exactitude de la prescription pour le calcul des interactions médicamenteuse et des cas de surdosage via le check VIDAL.

5.2. J'ai modifié la prescription d'un patient en séance, cependant cette modification n'est pas prise en compte dans la partie « Traitement en séance » de la feuille de dialyse du patient.

Lorsque vous éditer la prescription d'un traitement « En Séance » depuis Hemadialyse ou Hemaweb, la posologie se crée en fonction des jours de dialyse définis dans le dossier patient au moment de la prescription.

Si la séance de dialyse du patient a déjà été créée ou éditée au moment de la prescription, la table des traitements en séance pour cette séance ne seront pas mis à jour (cette table est verrouillée au moment de la création de la fiche).

Si vous souhaitez ajouter un traitement en urgence, cochez le paramètre « Prescrire en urgence » lors de l'édition/la modification d'un traitement afin d'envoyer une éphéméride sur tous les postes et les box consultant ce patient et alerter de la modification.

Afin d'éviter ce problème, nous vous conseillons de créer la feuille de séance d'un patient le jour même de son arrivée au centre.

5.3. Je cherche à ajouter un médicament / complément alimentaire / DM depuis la base VIDAL pour une prescription mais le bouton « Ajouter » n'apparaît pas, que faire ?

Vérifier l'existence d'un code CIP ou UCD13 pour le traitement que vous souhaitez ajouter.

L'ajout de médicament depuis la base VIDAL vers la base locale se fait via l'intermédiaire du code CIP et/ou UCD du médicament : C'est ce qui permet de garantir le lien entre le médicament dans la base locale et sa fiche détaillée dans la base VIDAL.

Si ce code n'est pas défini dans la base VIDAL (c'est le cas de certains compléments alimentaire par exemple), vous ne pourrez pas l'importer directement au sein de votre base locale et ne pourrez donc pas l'ajouter.

Vous devez contacter la pharmacie de l'établissement ou le responsable Hemadialyse de votre service pour ajouter manuellement les fiches nécessaires à la base locale.



Attention cependant : VIDAL ne pourra renvoyer aucune interaction ou alerte pour des médicaments ajoutés manuellement dans la base. Utilisez donc cette fonction en connaissance de cause.

Si le traitement concerné est bien un médicament et ne possède pas de code CIP ou UCD, veuillez contacter la hotline pour bénéficier d'une assistance.

5.4. Lorsque je prescris un médicament toutes les X semaines, la date de démarrage de la prescription n'est pas la bonne

Lorsque vous choisissez de fixer une fréquence d'administration « toutes les 4 semaines » par exemple, la semaine actuelle est toujours prise en compte comme la première semaine de prescription.


Ainsi, si vous prescrivez un traitement à prendre le Lundi toutes les 4 semaines un Mardi, la date de prochaine délivrance le prochain Lundi dans 4 semaines et non pas le lundi prochain.

Pour faire démarrer votre prescription à partir de la semaine prochaine, vous devez ajuster la date de début pour démarrer le Lundi prochain.

5.5. Une partie des traitements du patient ont été arrêtés

Vérifiez le paramétrage des traitements : il est possible de faire arrêter automatiquement TOUS les traitements lorsque leur date de fin est dépassée ou seulement ceux dont le statut « À arrêter en fin de traitement » est coché.

Lorsque le traitement approche de sa date de fin, l'icône  dans le Quickview du patient passe à l'orange (paramétrable) et une information « Date de fin proche » apparaît sur la ligne concernée dans la liste des traitements courants du patient :



Hemodialyse



Hemaweb

Le nombre de jour à partir desquels cette icône apparaît est également paramétrable.

Contactez votre référent Hemadialyse si vous souhaitez modifier le paramétrage de votre établissement.